顧問
井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

本草通串

正宗敦夫 編纂 校訂

自二十九卷
至三十四卷

合資會社 日本古典全集刊行會壽梓
長嶋豊太郎精刻

本草通串卷二十九

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

玄參

玄參味苦微寒無毒主腹中寒熱積聚女子産乳餘疾補腎氣令人目明一名重臺神農本經○太觀本草

本草經曰元參一名重臺味苦微寒生川谷治腹中

寒熱女子乳補腎氣令人目明生河閒神農本經太平御覽○

玄參本經中品【釋名】重臺本經【主治】腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目本經神農本經本草綱目○

本草云主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明神農本草湯液本草○

玄參味苦微寒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明　重臺神農本草盧復手錄○

元參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目○神農本草經疏吳懷泰輯要

玄參味苦微寒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明神農本草經○百種錄

玄參味苦鹹無毒主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精一名正馬生河間川谷及宛句三月四月採根暴乾名醫別錄○大觀本草

玄參【釋名】正名別錄【集解】別錄曰玄參生河間川谷及宛句三月四月采根暴乾【氣味】別錄曰鹹【主治】主暴

中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹堅癥定五臟久服補虛明目强陰益精別録名醫別録○本草綱目

主暴中風傷寒身熱腹滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴名醫別録○湯液本草

鹿腸玄蔘也廣雅

〔音〕幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也凡玄之屬皆从玄胡涓切〔音〕古文玄

〔蘉〕人蔓藥艸出上黨説文从艸漫聲山林切

玄參一名玄臺一名鹿腸一名鬼藏生河間川谷及
寃句三月四月採根暴乾吳普本草大觀本草○
吳氏本草曰元參一名鬼藏一名正馬一名重臺一
名鹿腸一名端一名元臺神農桐君黃帝雷公扁鵲
苦無毒岐伯鹹李氏寒或生寃句山陽二月生葉如
梅毛四四相值似芍藥黑莖方高四五尺華赤生枝
間四月實黑吳普本草太平御覽○
玄參【釋名】玄臺吳普鹿腸吳普鬼藏吳普【集解】普曰生寃句
山陽三月生苗其葉有毛四四相值似芍藥黑莖莖

方高四五尺華赤生枝間四月實黑【氣味】普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯寒吳普本草○本草綱目

陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香神農本草陶弘景註○大觀本草

【釋名】弘景曰今出近道處處有之莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香神農本草陶弘景註○本草綱目

雷公云凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾然使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人

目揀去蒲草盡了用之炮炙論○大觀本草

根【修治】斆曰凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時晒乾用勿犯銀器餌之噎人喉喪人目炮炙論○本草綱目

惡黄耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆藥對○大觀本草

【氣味】之才曰惡黄耆乾薑大棗山茱萸及藜蘆藥對○本草綱目

【玄參】藥性論云玄參使一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘻瘰癧藥性論○大觀本草

【釋名】逐馬藥性【主治】熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤瘻瘰癧甄權藥性論○本草綱目

唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也唐本注○大觀本草

【集解】恭曰玄參根苗並臭莖亦不似人參未見合香唐本注○本草綱目

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧灑灑血瘕下寒血除胸中氣下

水止煩渴散頸下瘰癧膧心腹痛堅癥定五臟久服
補虛明目强陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸
一名正馬一名咸一名端生河間川谷及寃句三月
四月採根暴乾千金翼方
遠之久尨　味少甘久无香无毒六月開花八月採
日乾而用大同類聚方
臣禹錫等謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能
治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘻瘰癧蜀本草掌
禹錫按○
大觀本草

玄參 於之久佐 新選字鏡

玄參一名重臺 逐竜反 楊玄操音 一名玄臺一名鹿腸一名

正馬一名咸一名端一名𩔈草 出陶景注 一名鬼藏 出釈藥性

玄參者玄精也 出范注方 和名於之久佐 本草和名

伊賀國卅三種 玄參 ヲシクサ 八斤○尾張國四十六種

玄參十二斤○近江國七十三種 玄參十二斤○

安藝國卅三種 玄參三斤○紀伊國卅五種 玄

參一斤 延喜式

玄參 本草云玄參一名重臺和名於之久佐 和名類聚

鈔

〔玄〕幽遠也黒而有赤色者為玄象幽而入覆之也凡玄之屬皆從玄臣鍇曰玄之又玄彌遠也周禮三入為纁纁絳也五入為緅緅紅也七八為緇注云爾雅一染謂之縓凡玄色緅緇之間其六入者是黒而有赤色也班婕妤賦曰潜玄宮兮幽以清玄宮深宮也古文也螢先反〔[illegible]〕古文元〔蔘〕人蔘藥草出上黨從草浸聲臣鍇按本草作參字異者人形也師令反 說文解字

通釋

〔今注〕詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼爲馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注云根苗並臭蓋未深識爾 馬志開寶本草○大觀本草

玄參〔釋名〕馥草 開寶 志曰合香家用之故俗呼馥草〔集解〕志曰其莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩陶云莖似人參蘇言根苗並臭似未深識 開寶本草○本草綱目

日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥劣乏骨蒸傳尸邪氣止健妄消腫毒日華本草○大觀本草

〔主治〕治遊風補勞損心驚煩躁骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒〔太明〕日華子太明○本草綱目

圖經曰玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七

枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安釜中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取出再擣熟如乾更用熟蜜和甕器盛𢈔埋地中旋取使入龍腦枝亦可以熏衣圖經○大觀本草

〔集解〕頌曰二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若

竹者高五六尺其根一根五七枚三月八月采暴乾或云蒸過日乾蘇頌圖經本草綱目○

衡州玄參　邢州玄參　江州玄參三月四月採根暴乾備急本草

圖拔

玄參曰重臺曰玄臺曰鹿腸曰正馬曰感曰端曰逐馬曰顴草昆蟲草木略

廣雅曰鹿腸元參也　建康出元參、范子計然曰元參出三輔青色者善　本草經曰元參一名重臺味苦微寒生川谷治腹中寒熱女子乳補腎氣令人

目明生河間　呉氏本草曰元參一名鬼藏一名正馬一名重臺一名鹿腸一名端一名元臺神農桐君黃帝雷公扁鵲苦無毒岐伯鹹李氏寒或生冤句山陽二月生葉如梅毛四四相值似芍藥黑莖方高四五尺華赤生枝間四月實黑太平御覽

玄參　氣寒　味微苦　象云足少陰腎經之君藥也治本經須用李東垣藥類法象○湯液本草

玄參　氣微寒　味苦鹹　無毒○易老云玄參乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁風藥中多用

之故活人書治傷寒陽毒玄參升麻湯治汗下吐後毒不散則知爲肅清樞機之劑以此論之治空中氤氳之氣無根之火以玄參爲聖藥湯液本草

【氣味】元素曰足少陰腎經君藥也治本經須用之

【發明】元素曰玄參乃樞機之劑管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒陽毒汗下後毒不散及心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕者俱用玄參以此論之治胷中氤氳之氣無根之火當以玄參爲聖劑也張元素○本草綱目

玄參攻喉痛　玄參即山麻　味苦鹹微寒無毒今處處有之除風熱明眼目　玄參治結熱毒癰清利咽膈藥性

賦

玄參　味苦鹹氣微寒無毒春生深谷莖方葉似芝蔴文如槐柳細長秋取傍根正根勿用初白乾旋紫黑鼻聞微臭咀片忌銅誤犯餌之噎喉喪目古人深戒具載醫通郡韓氏醫通　惡黃耆大棗生薑山茱黃耆大棗乾薑山茱反藜蘆一味可為君藥惟走腎經強陰益精補腎明目治傷寒身熱支滿忽忽如不知人療溫瘧寒熱往來灑灑時常發顫除

女人産乳餘疾歐男子骨蒸傳尸逐腸内血瘕堅癥
散頸下痰核癰腫葢此乃樞機之劑管領諸氣上下
肅清而不致濁治空中氤氳之氣散無根浮遊之火
惟此爲最也本草蒙筌
玄參味苦鹹性微寒無毒入心肺腎三經主腹中寒
熱積聚女子産乳餘疾補腎氣除心煩明眼目理頭
風瘰咽喉消癭瘤散癰腫解熱毒惡黄耆乾薑大棗
山茱萸反藜蘆勿犯銅器餌之噎喉損目按玄參氣
輕清而苦故能入心肺以清上焦之火體重濁而鹹

故能入腎部以滋少陰之水所以積聚等症靡不療之

雷公云 凡採得須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出晒乾使用時勿令犯銅餌之後噎人喉損人目揀去蒲草盡了用之 鐫補雷公炮製藥性解

玄參 味苦氣寒無毒足少陰腎經藥也 陶隠居曰生河間川谷及寃句今仁和筧橋山陽近道亦有二月生苗高四五尺其葉有毛莖方而細色青紫葉似芝蘇對生如槐柳尖長邊有鋸齒七月開花青碧八月結子褐色又有白花者莖方而大有節若竹色紫赤葉似烏藥七月開花白色或茄花色形似夫薊花端叢刺刺端有鈎最堅且利八月結子黑色其根一株五七枚有腥氣七八月釆旁根暴乾老根不用在地者中空或云地蚕食之故也○此藥 忌犯銅鐵器 ○

玄參濟水滋陰散風解熱之藥也散火鬱解陽明胃

熱之疹瘄益陰精治虛勞寒熱之骨蒸此乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁故上焦之火發于咽喉腮頰唇齒之間焮赤腫脹及皮膚癍疹不消痘瘄火鬱不透下焦之火小便赤濁癃閉淋瀝小腹急疾及腎水受傷孤陽浮越發爲火病當壯水以制陽光惟玄參與生地爲最也又陰虛火盛咳嗽無痰腎銷骨蒸勞熱潮熱又傷寒汗下後熱毒不散心下懊憹不得眠心神顛倒欲絶者以上諸證俱用玄參其功可知矣其味苦其氣寒具備少陰之體用者也○

金匱昭先生曰玄參乃樞機之劑配荊防而治火于上配知栢而治火于下配膽星半夏祛一切暴發風痰配知母麥冬療一切虛火痰嗽配升麻鼠粘起痘瘄于將萌之初配麥冬竹葉解傷寒陽毒于汗下之後此藥性寒而潤如胃寒停飲腹脹寒熱脾虛泄瀉並不宜服○盧子由先生曰玄參味苦氣寒本草言補腎氣者補腎氣方萌之機兆非補腎藏欲藏之形質本草彙言

玄參本經中品 釋名 黑參綱目 野脂麻綱目 時珍曰玄黑色也

別録一名端一名咸多未詳〔集解〕時珍曰今用玄參正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以為臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種〔主治〕滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯時珍〔發明〕時珍曰腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘰癧亦是散火劉守真言結核是火病本草綱目

玄參用酒洗去塵土切片晒乾用玄參行表治浮遊無根之火得酒氣而力愈健古今醫統

玄參一名鹿腸一名馥草一名玄臺一名重臺一名正馬一名逐馬一名鬼藏一名野芝麻宿根二月生苗葉似芝麻對生又如槐柳而尖長有鉅齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黒色又有白花者莖方大紫赤色有細毛有節若竹者高五六尺一根五七枚微有腥氣地蚕喜食之故其中空味苦微寒無毒治胸中氤氳之氣無根之火大凡腎水受傷陽失守孤陽無根發爲火病宜壯水以制火故玄參與地黄同功其消瘰癧解癥毒亦以散火之故〔療治〕赤

脉貫瞳玄參爲末以米泔煮肝日日蘸食　發狂咽
痛玄參升麻甘草各半兩水三盞煎一盞半温服
急喉痺風不拘大人小兒玄參鼠粘子半生半炒各
一兩爲末新水服一盞立瘥群芳譜
元參味苦鹹氣微寒無毒忌銅器犯之噎喉喪目入
肺胃二經強陰益精補腎明目瀉傷寒身熱支滿忽
忽如不知人療温瘧寒熱往來灑灑之時當發顫除
女人產乳餘疾祛男子骨蒸傳尸逐腸血瘕堅癥散
頸下痰核癰腫乃樞機之劑領諸氣上下肅清而不

濁治空中氤氲之氣散無根浮遊之火惟此爲最前人之論如此近人輕之不用即用之不敢多豈知元參乃君藥實可恃之奪命以救人者乎夫天下最難治者火症也火症之中尤難降者無如胃腎之二火腎火沸騰乃龍雷之火也其勢尤烈以苦寒折之反致增焰焚林劈木每在陰寒大雨之時夏日炎氛之際一遇涼風白露龍雷収藏矣故以苦寒直治不若以微寒從治元參正微寒之品而又善散浮遊之火治之正復相宜此治腎火之所必需也若胃火之起

若燎原不盡不止往往熱氣騰天火星日出登高而歌棄衣而走見水而入苟不幸涼微寒之藥救之乃發狂亡陽之時身喪此非急用白虎湯不可然石膏過寒多服損胃雖一時救急不可以善後元參治空中氤氳之氣瀉火正其所長苟用之後即繼之以元參則陽火自平而陰火又長何有亡陽之患乎此又治胃火之所必需也但勺水難以救焚反致焰以增火乃陽火也必多用元參然復可以竭生勢即腎火乃陰火也又必多用元參然後可以息其熾況元參

原是君藥不妨自一兩用至五六兩以出奇制勝倘畏首畏尾不敢多用聽其死亡而不救冀免于無過難矣吾願行醫者聞吾言而重用元參以治胃腎之二火可乎○或問元參以退胃腎之火旣不損胃又且滋陰但必然多用不妨一兩以用至五六兩毋乃太多恐脾胃難于承受萬一變生飽悶不欲飮食之症奈何噫是過慮矣夫胃腎之火上騰者由下之無水也火旺之極乃水虧之極水不虧乃火不旺天地之道陰陽所以相根人身之中水火原以相召有水

以制火乃火安平下焦斷不沸越于上焦也故火不得水乃已一得水乃相安斂戢甚神且速也然乃火之騰空正望水不可得惟恐水之細微不足以解其燥烈之炎氛豈有得滂沱反厭惡作祟之理是以入于胃而胃甦入于脾而脾樂況胃腎二火炎上各經之水皆爍水即滂沱尚恐分潤之不足何至有觸留于脾胃艱于承受致生飽悶不欲食之症哉此必無之事可放膽用之而吾猶以為少耳更當佐之以麥冬益之以生地甘菊庶幾同群共濟有露足之快也

〇或疑元參退浮遊之火退上焦之虛火吾子盛稱其功得無錯認腎中之火上浮耶非錯也夫浮遊之火正下焦之火非上焦之火凡火在上焦者盛易消火在下焦者炎難息元參解下焦之火故非多用不能成功蓋上焦之火肺火也心火也肺火用黃芩心火用黃連不易之法也肺火雖盛黃芩用二錢無不清涼心火雖烈黃連用三錢無不消滅正以上焦之火原易炎上又易解故也若下焦之火非出之于肝木即出之于腎水肝腎之火皆龍雷之火之倏然上

騰倐然下降其浮遊無定之狀實予人難以捉摸非大用元參乃水不足濟火其焚林劈木之威有不可言者矣人見用元參不能降火誰知是少用元參不能以益水耶總之實火可瀉而虛火可補瀉實火可少用寒凉而瀉虛火必須多用滋潤此元參退腎肝之虛火斷宜多用以定其浮遊切戒少用以增其酷烈也○或疑元參退浮遊之火火退又用何藥使浮遊之火不再浮遊抑仍用玄參爲善後之策乎夫元參可以退一時之火安能退久遠之火火性炎上非

水不足以濟一時之急火性又善藏非水不足以救萬火之炎用元參以除火隨用肉桂以安火大用元參少用肉桂或佐之以純補真陰之藥自然火得水以相制水得火而偕藏又何至再爲浮遊哉○或疑元參用之于肉桂之中恐寒熱之未宜此乃未知陰陽之妙矣夫陰陽之道彼是相根無陰乃陽從何生無陽乃陰從何長元參得肉桂乃陰易生肉桂得元參乃陽又易長惟陽長而後陰消陰于下而火不騰于上矣二味合用正陰陽之妙用也○或疑陰陽平

而後無病今用元參肉桂一多一少吾恐輕重不同陰陽不得其平也夫陰陽之不平也久矣誠觀天地無不陰多于陽羣陰之中得一陽安穩倘陽多于陰乃成酷烈世界矣夫一身之中五臟六府無非火氣然非水氣之溺滿乃又成焦枯腹體矣所以補陰之藥不可不易而補陽之藥不可不少益陰旺則水旺可以製火若陽旺乃火旺必至爍水矣敬不可誤認之滋陰必宜多肉桂益陽必宜少二味一多一少似于陰陽之不得其平誰知陰多于陽正陰陽兩得其

平哉○或疑元參降火又知母黃栢之流要之先生
戒知毋黃栢之不宜輕用又勸人治浮遊之火者多
用元參何其自相背謬乎非謬也元參微寒非大寒
大寒之地草木不生微寒之地草木更茂余所以棄
黃栢知毋而取元參地骨也况元參地骨微寒之中
又有滋補之味異于黃柏知毋遠甚烏可同類而並
論哉○或疑寒涼既自損于脾胃而微寒之藥豈無
損哉夫治病去其甚者未可一概盡去吾患黃栢知
毋過于寒涼非盡謂寒涼之不可用也故知毋黃栢

尚稱其功以示可用豈元參地骨微寒之藥而反去之乎況元參地骨治虛火之內熱上遊矣有殊功余又何可不亟爲表揚以勸世之必用矣哉○或問元參微寒何以能瀉浮遊之火耶益火分虛實實火宜大寒之品以降其炎騰之勢虛火宜微寒之味以引其歸斂之途元參瀉中有補治虛火實宜浮遊之火正虛火也故亟需之耳本草新編

玄參　重臺　玄臺　正馬　鹿腸　馥草事物異名

玄參性微寒味苦鹹無毒治熱毒遊風補虛勞骨蒸

傳尸邪氣消腫毒散瘤癭瘰癧補腎氣令人目明○苗葉似脂麻七月開花青碧色八月結子黑色其根尖長生青白乾卽紫黑新者潤膩三月四月八月九月採根暴乾或云蒸過日乾本草○玄參乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁以此論之治虛中氤氳之氣無根之火以玄參爲聖藥也湯液○腎傷必用之足少陰腎經之君藥也酒蒸亦好入門○我國惟慶尚道出焉未知眞否俗方東醫寶鑑

玄參　苦鹹微寒色黑入腎能壯水以制火散無根

浮遊之火腎水受傷真陰失守孤陽無根發爲火病益精明目利咽喉通二便治骨蒸傳屍傷寒陽毒發斑亦有陰症發斑者懊憹鬱悶不煩渴溫瘧洒洒喉痺咽痛本腎藥而治上焦火症壯水以制火也腎脉貫肝膈入肺中循喉嚨系舌本腎虚則相火上炎此喉痺咽腫咳嗽吐血之所由來也潮熱骨蒸亦本于此瘰癧結核寒散火鹹軟堅癰疽鼠瘻音漏肺虚泄瀉者忌用〇蒸過焙用勿犯銅器惡黄耆山茱萸反藜蘆增訂本草

備要

元參稟北方水氣兼春陽之和入足少陰腎經黑乃水色苦能下氣寒能除熱鹹能潤下軟堅散結涼血

降火故甄權主散瘤癭瘰癧時珍解斑毒利咽喉也
○同黃連大黃等分蜜丸梧子大白湯下三四十丸
治三焦積熱本草經疏輯要
玄參味苦微寒主腹中寒熱積聚皆火氣凝女子產乳餘疾產後血虧衝脉之火易動結之疾清血中之火則諸疾平矣補腎氣令人目明
除陰分之火則頭目清明矣○玄參色黑屬腎而性寒故能除腎家浮遊上升之火但腎火有陽有陰陽火發于氣分
火盛則傷氣內經所謂壯火食氣是也陰火發于血
分火盛則傷血內經所謂諸寒之而熱者取之陰是

也産後血脱則陰衰而火無所制又不可以寒涼折之氣血未寧又不能納峻補之劑惟玄參寒火而帶微補用之最為的當也神農本草經百種録

鹿腸　博雅鹿腸元參也又敗醬草亦名鹿腸　元臺　重臺　正馬　逐馬　馥草　鬼藏　本草綱目黒參一名元臺一名重臺一名正馬一名逐馬一名馥草一名鬼藏別録一名端一名鹹參未詳馬志曰合香家用之故俗呼馥草又丹參亦名逐馬事物異名録

〔玄〕呼沿切音懸黑而有赤色周禮染人六入爲玄註玄色緅緇之間是黑而有赤色也正字通

玄〔先濁〕胡涓切音懸黑而有赤之色字彙

馥草卽玄參葉似芝蔴又如槐柳青紫細葉七月開花青碧色隨結黑子亦有白花莖方大紫赤色而有細毛其節若竹高五六尺葉如掌大而尖長邊如鋸齒其根亦尖長生青白乾卽紫黑微香可入藥秘傳花鏡

〔原〕玄參一名黑參以色名也本草註云其莖微似人參故得參名一名鹿腸一名馥草開寶本草云合香家用之故俗呼馥草一名玄臺一名重臺

一名正馬一名逐馬一名鬼藏一名野芝麻宿根二月苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黒色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺一根五七枚微有腥氣地蠶喜食之故其中空味苦微寒無毒治胸中氤氳之氣無根之火與地黄同功其消瘰癧解斑毒亦以散火之故〔別録〕〔増〕〔炮炙論〕凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時曬乾勿犯銅器餌之噎人喉喪人目（廣群芳譜）

元參　出仁和筧橋者佳一名重臺忌銅鐵器燒之其香可以治瘺杭州府志

玄參　一名重臺一名元臺七月開花青白色蕪湖縣志

玄參　右件諸品本草圖經雖不言所出道理然皆境土所有故備録之重修滇江府志

藥之屬凡四一曰草部有元參一名重臺燒其香可以治瘺錢塘縣志

玄　廣韵集韻韵會正韵竝瑚涓切音懸說文長箋黑而有赤色者爲纁有黄色者爲玄康熙字典

玄參和名於志久佐異名黒參綱目玄臺呉普増補異名

重臺本經鹿腸呉普正馬別録逐馬藥性馥草開寶野脂麻綱目鬼

藏呉普多識編

玄參一名重臺神農本草一名玄臺名醫別録一名鹿腸同上

一名正馬同上一名咸同上一名端同上一名馥草開寶本草一

名黒參本草綱目一名逐馬同上一名野脂麻同上一名鬼藏

同上一名山麻青嚢藥性賦　玄參陶隠居云今出近道處

處有蔓似人參而長大根甚黒亦微香道家時用亦

以合香唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶

云道家亦以合香未見其理也今注詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼爲馥草酒漬飮之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭葢未深識爾嘉祐補注本草

玄參生河間及寃句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖邊如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者

潤膩一根可生五七枝三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾（本草圖經）今用玄參正如蘇頌所說有腥氣故蘇恭以爲臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種（明李東璧本草綱目）陶隱居曰生河間川谷及寃句今仁和筧橋山陽近道亦有二月生苗高四五尺其葉有毛莖方而細色青紫葉似芝蔴對生如槐柳尖長邊有鋸齒七月開花青碧八月結子褐色又有白花者莖方而大有節若竹色紫赤葉似烏藥七月開花白色或茄花色形似大薊花端叢刺刺端有鈎

最堅且利八月結子黑色其根一株五六枚有醒氣七八月采傍根暴乾老根不用在地者中空或云地蠹食之故也（明倪朱謨本草彙言）玄參葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色開花青碧色子黑色（八閩通志）玄參莖似人參而長紫赤色葉如掌根甚黑微香（江陰縣志）玄參卽山麻（青囊藥性賦）玄參二月生苗高四五尺莖方而大作節若竹色紫赤有細毛葉生枝間四四相值形似芎藭七月開花白色或茄花色形似大薊花端叢刺刺端有鈎最堅且利八月結子黑色一種莖方而

細色青紫莖似脂麻對生又似槐柳尖長邊有鋸齒七月開花青碧八月結子黑褐根都科生一根五七枚生時青白乾卽紫黑宜三八月采清劉若金本草述

馥

草卽玄參葉似芝蔴又如槐柳青紫細莖七月開花青碧色隨結黑子亦有白花莖方大紫赤色而有細毛其節若竹高五六尺葉如掌大而尖長邊如鋸齒其根亦尖長生青白乾卽紫黑微香可入藥清陳淏子秘傳花鏡 庶物類纂

玄參 鹹苦選黑潤者用蒲草重重相隔蒸晒勿犯

銅器犯之損人喉喪人目惡黃耆乾大棗山茱萸反

藜蘆 本草 喉襟

玄參　黑參　玄臺　重臺　鹿腸　正馬　逐馬

馥草　鬼藏　野脂麻　本網玄參二月生苗葉似

脂麻對生又如槐柳而尖長有鉅齒細莖青紫色七

月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大

紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一根

五七枚有腥氣生青白乾即紫黑色宿根多地蠶食

之故其中空（氣味）苦微寒　足少陰腎經君藥治胸中

氤氳之氣無根之火凢腎水受傷眞陰失守孤陽無根發爲火病者宜壯水以制火故玄參與地黄同功治鼻中生瘡者玄參末塗之惡黄芪乾薑大棗山茱萸反藜蘆勿犯銅器餌之壹人喉喪人目△按玄參和名於之久佐往昔有出於本朝今乃無之皆用唐擇之柔而中黒者佳堅而中帶赤者不佳倭漢三才圖會

玄參　和名　クロクサ　又ヲシクサ　又コヽクサ　所々山林ノ間ニ多ク有之高サ三四尺莖方ニメ一節每ニ對シテ生ス胡麻ノ葉ニ似タリ

其梢ニ花ヲ付黄花有リ紫花アリ子ヲ結フヨク
生ス其根ハ芋ノ如ク肉白シ日乾スル時ハ黑ク
ナル本草花蒔繪

玄參　宿根ヨリ春生葉形ホソナガク兩對ニ付
莖方ナリ花ハ穗ノゴトクニノベニムラサキ色
ナリ愛スベシ又一種有リ形狀同シテ花ノ色ウ
ス黃色ナルアリ莖モ青シ廣益地錦抄

玄參〔釋名〕時珍曰玄黑色也弘景曰其莖微似人參
故得參名〔修治〕生剉用或焙用或蒸過晒乾大而不

朽黒潤者佳忌鉄器一曰忌銅而不忌鐵〔氣味〕苦鹹微寒無毒〔能〕入腎經補腎明目滌熱除驚理傷寒狂邪癖毒療虚勞燥渇骨蒸外科治瘰癧癰疽女方主産乳餘疾〔毒〕悪黄芪乾薑大棗山茱萸反藜蘆滋陰劑中須用蒸晒差減寒性然亦不可久用也〔修治〕蒸シテ可用薬肆ニアル唐ヲ可用和ニモアレ𪜈賣買ニナシ〔能〕本草新編甚ヨシ胃腎ノ二火ヲ瀉スルトアルユヘニ利咽喉明眼目散瘰癧此上焦ノ火腎火亢テ上焦ヲ煎逆スルユヘンナリ或ハ煩

渇發斑ハ胃火ナリ玄參ヨク胃腎ノ火ヲ瀉スルユヘニ此能アリ又新編云白虎湯ヲ用テ陽病ヲ治スル石膏ハ寒ニ過テ多服久服ハナリガタシ此ニツグニ玄參ヲ以テスルトナリ尤ナルコトナリ扨腎火ヲ瀉スルニ少シ用并テハ功ナシ一兩ヨリ五兩六兩マデ用并ヨトアリ少シ肉桂ヲ加ヘテ反佐セヨトアル、サレ圧コノヤウニ大分ハ用ラレマイ兎角多ク用テ肉桂ヲ少シ加ヘル藥ト意得ベシ扨利二咽喉一明二眼目一ノ組合セハ經

疏ニ詳ナリ片玉六八本草

玄參　和漢皆可用但關東ノ産根最モ佳ナリ京都叡山ニ生スルモノハ形似タリトイヘモ根堅如木根絶無氣味經晒乾色不變黒疑別物也不可用　黒參即玄參ナリ　逐馬玄參用藥丹參須知

玄參　御藥院ニアリ花紫ニメ桔梗ニ似タリト云　賀云江戸ノ産佳ナリ又藥園ノモノ渡リニ不劣ナリ　會誌云方莖對メ生ス葉莖長キ𠃍三四尺根生姜肥大ナルゴトシ本草會誌

玄參　和名ゴマクサ苗ノ高サ六七尺莖方ニ〆葉兩面相對〆胡麻葉ニ似タリ根乾ハ黒色ナリ

○東都產上品淡黄花ノモノアリ褐色花ノモノアリ物類品隲

玄參　ヨシクサ延喜式　ゴマクサ　ゴマノハグサ

一名　玄武精千金方　野芝麻群芳譜　鹿陽生類書纂要　黒玄參證治準繩　山麻藥性奇方　元參本草新編　能消草鄉藥本草　淩霄草村家方

數種アリ武州道灌山目黒大宮八幡及和州ニ產スル者真物ナリ世人訛

傳ヘテ唐種ノ玄參ト云春舊根ヨリ苗ヲ生ズ莖ニ四稜アリ高サ四五尺葉兩兩相對ス形長クメ尖リ周邉ニ鋸齒アリテ兎兒尾葉ニ似テ淡緑色深秋ニ至リ枝梢ゴトニ穗ヲ出シ多ク花ヲ綴ル長サ六七寸肥タル者ハ一二尺ニ至ル穗ニ枝ナク花色淡黄大サ三分許形小臼ノ如シ後小尖莢ヲ結ブ内ニ細黒子アリ根ハ直クメ肥大長サ二三寸數塊集リテ天門冬根ノ如ク色白シ此ヲ切バ便チ黒色ニ變メ漆ノ如シ此根乾カシテ柔潤

ナリ上品トス京師山中ニ産スル者ハ皆根堅硬
是山玄参ニメ下品ナリ葉形ハ異ナラズ又濶短
ニメ尖ル者アリ皆深緑色穗ニ枝多ク花色紫黒
又黄色ヲ帶ル者アリ倶ニ俗ニ　ヒナノスツボ
ト呼畧メヒナノウスト云花ノ形ニヨルナリ江
州ニテ　スキノサキト呼葉ノ形ニ因ナリ又ヒ
ナノウスニ一種葉短ク鋸齒粗ナル者アリ最下
品ナリ　市中ニ漢渡多シ武州和州ノ産モ用ル
ニ堪タリ　本草綱目啓蒙

玄參　クロクサ近道處々山谷ニアリ三月苗ヲ生ス其葉脂麻ニ似テ長大細毛アリ兩々相値フ莖方ニシテ高サ四五尺六七月青碧色ノ花ヲ開ク八月子ヲ結フ又紫花ノ者黄花ノ者アリ花彙

玄參　ゴマクサ　紫花黄花ノ二品アリ黄花ノ者内黒ク滋潤アリ上品ナリ　紫花ノ者堅硬ニメ藥用ニ不堪「金匱要略」黒参玄參ナリ「和劑局方」藥名考

䪥草　ゴマグサ　ゴマノハ　卽玄參ナリ

秘傳花鏡譯說

鹿腸 ゲンジンナリ○重臺 ゲンジンナリ○逐馬 ゲンジンナリ又タンジンナリ○野脂麻 ゲンジンナリ○玄参 黒参 ヲシクサ 唐和色黒ク味甘キモノ佳ナリ○玄臺 ゲンジンナリ○馥草 馥香 玄参ナリ○黒参 ゲンジンナリ○鬼藏 玄参ナリ藥品手引草

玄参 先輩千鳥グサトスルハ非ナリ【和名】ゴマクサ 本邦古ヨリアリ中比絶ヘテ出サズ近歳江戸道灌山ヨリ出ツ漢種 官園ニアリ形狀和産ト相似テ小袴葉アリ生玄参汁 玄参ノ生ノ

シルナリ 千金方藥註

玄參 和産眞ナリ 本草正譌

蓡說文人蓡藥草出上黨本草遂謂後世因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然而前漢史游急就篇遠志續斷參土瓜顏師古註參謂人參紫參玄參沙參苦參也又王符潛夫論云治病當得人參反得羅服則本草之言不必矣 醫賸

玄參 一名鬼藏 本草和名引釋藥性 玄精 同上引范注方 和名ヲシクサ 本草和名 和名抄 ゴヽクサ 葉ノ形胡麻ニ似タリ ト

ノヘキナ蝦夷臺名スクロピユラリア羅甸スペ
ーンコロイド荷蘭紫黒花ノモノト黄白花トノ
二種アリ武州道灌山煉馬大宮八幡及和州豆州
平井山ニ自生アリ春宿根ヨリ生ス葉ハ胡麻ニ
似タリ鋸齒又水蔓菁葉ニ似テ深緑色墊窊面葉
對生ス高サ五六尺梢ニ穗ヲナシ天麻ノ如キ花
ヲ開テ形小臼ノ如ク又脣ノ如ク紫黒色後蒴ヲ
結ブ小指頭ノ大サナリ根天門冬ノ如クニメ肥
大又三七根ニ似テ母指ノ大サ長キモノ七八寸

十月採根シテ沸湯ヲカケ日ニ晒シ乾ストキハ
黒色滋潤ナリコノ物上品藥用ニ入ベシ一種武
州品川木原ニ生スルモノハ葉尖リテ鋸齒粗ク
穗長ク枝ヲ生ス黄白花ヲ開クコノ根硬ク潤少
シ下品ナリコレヲ京ニテヒナノウス　一名ス
キノサキ江州トモ云フ本草穿要

玄參　ゴマクサ　武州品川ニアルハ花淡黄色
形唇ノ如ク天麻花ニ似テ小サク黄色葉ハ胡麻
ニ似テ方莖對生シ根ノ形天門冬或ハ薯蕷ノ如

ク生十六ハ白色乾クトキハ黒色滋潤アリ　一種

武州道灌山煉馬大箕谷和州豆州平井山等ニアリ上品ナリ形狀前種ト同ク莖紫色花紫黒色根肥大ナリ本草圖譜

オシグサ　玄參　雲州　於之久佐　和名抄　○ゴマノハグサ　玄參　本綱十二

○ゴマグサ　玄參　城州　○ヒナノウス　山玄參一種　京　天台山ニアリ一根叢生葉短シヤマハツカニ似テ花形玄參ニ類メヒナノウスニ似タリ故ニ同名ス根堅硬白色ニメ生姜ノ如シ故ニ又ヤマメウガト云　○ヒナノウス　山玄參　本草原始　葉ハ兩對扁メ鋸齒有リ三四尺穗出テ花着ク形臼ニ似テ紫黒此根枯レテ潤無キモノ下品

○ヒナノウスツボ　同上本草藥名備考和訓鈔

玄參一名黑參一名重臺一名野脂麻二月生苗至四五月高三四尺莖有四稜其葉似胡麻而兩々相値至八九月莖端有花其形類豆花生肥土者根長四五寸春秋採根陰乾用焉其色如地黃者最眞也又有一種大葉者其根堅勁而不好也反藜蘆忌鐵器矣　今往々山野皆有之至二三月高四五尺其葉似胡麻而大兩々相對生七八月之間枝端有花形類藜蔔花其實如劉寄奴生肥土者根長八九寸

内堅實而不好不堪入藥矣人參譜

玄參本草 羅甸名ニテ「スコロヒラリヤ」トイヒ和蘭ニテ「スクローヘルコロイド」トイフ山ノ赤土或ハ少シ陰地ニテモヨシ畦ニ春芽出シノ比分ケテ値ベシ一年ニ花實アリ實生自然トアルヲ畦へ分チ植テ度々糞水ヲ澆ギテヨシ草木育種

玄參 本草和名云於士久左延喜式云伎治久左

俗云胡麻草其莖葉幾如胡麻秋月擢穗開小花有紫白二種其根生白乾成黑隨地殊多從新云玄參色本青白其

黒色乃後來濕蒸之壊色若本草綱
収秉時卽晒乾並不黒也目纂疏

馥草 ルリクラベ 本綱玄參釋名 花鏡并百

花録多識
正名

ゴマノハグサ 玄參 玄武精千金
方 一種ヒナ

ウスツボ紫花ノ
モノ 山玄參本草
原始物品
識名

玄參根
ゴマノハクサ 舶來多シ上品ナリ和産ヲ售

モノ少シ和産ハ山玄參ニノ根堅シ下品ナリ日
用

藥品
考

本草通串巻三十

冨山侍従兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

地楡

地楡味苦微寒主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡神農本經○大觀本草

神農本草經曰地楡苦寒主消酔生寃句　本草經

曰地榆止汗氣消酒明目神農本經○太平御覽

地榆本經中品〔主治〕婦人乳産瘁痛七傷帶下五漏止痛止汗除惡肉療金瘡本經神農本經○本草綱目

地榆味苦微寒主婦人乳産瘁痛七傷帶下五漏止痛止汗除惡肉療金瘡神農本草經疏○吳懷祖輯要

地榆味苦微寒主婦人乳産瘁痛七傷帶下五漏止痛除惡肉止汗療金瘡神農本經○盧復手録

本草云主婦人乳産七傷帶下月水不止血崩之疾除惡血止疼痛腸風泄血神農本草○湯液本草

地楡味甘酸無毒止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消
渇補絶陽産後内塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山
谷二月八月採根暴乾名醫別録大觀本草○
地楡【集解】別録曰地楡生桐柏及冤句山谷二月八
月采根暴乾又曰酸赭生昌陽山采無時【氣味】別録
曰甘酸【主治】止膿血諸瘻惡瘡熱瘡補絶傷産後内
塞可作金瘡膏消酒除渇明目別録酸赭味酸主内漏
止血不足別録名醫別録本草綱目○
止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渇補絶傷産後内

塞 名醫別録○呉懐祖輯要

【地】元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也从土也聲徒四切【墬】籀文地从隊【榆】榆白枌从木俞聲羊朱切說文

菗疇蒢除地榆也廣雅

陶隠居云今近道處々有葉似榆而長初生布地而花子紫黒色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好今按別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效神農本草陶弘

景註○大觀本草

地楡【釋名】玉豉弘景曰其葉似楡而長初生布地故名其花子紫黑色如豉故又名玉豉【集解】弘景曰其根亦入釀酒道方燒作灰能爛石故煑石方用之其葉山人乏茗時采作飲亦好又可煠茹神農本草陶弘景註○本草綱目

得髮良惡麥門冬藥對○大觀本草

毒蛇螫人擣地楡根絞取汁飲兼以漬麻子抱朴子

療虎犬咬人地楡根末服方寸匕日一二服傅瘡尤

佳（肘後方○大觀本草）

〔毒蛇螫人〕新地榆根擣汁飲兼以漬瘡〔下血不止〕二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煑一升頓服若不斷以水漬屋塵飲一小盃投之〔小兒疳痢〕地榆煑汁熬如飴糖與服便已（肘後方○本草綱目）

〔氣味〕之才曰得髮良惡麥門冬伏丹砂雄黃硫黃（藥對○本草綱目）

地榆汁釀酒治風痺補腦（齊民要術）

齊民要術云地榆汁釀酒治風痺補腦（齊民要術○大觀本草）」

地榆味苦平能治產後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血
痢餘 藥性論○ 餘膿 大觀本草

根 氣味 權曰苦平 藥性論○ 本草綱目

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定

用葉作飲代茶甚解熱 唐本注○ 大觀本草

葉 主治 作飲代茶甚解熱 蘇恭 唐本注○ 本草綱目

千金翼代指逆腫單煑地楡作湯漬之半日愈千金翼方○大觀本草

附方代指腫痛地楡煑汁漬之半日愈小兒疳痢地楡煑汁熬如飴糖與服便已小兒濕瘡地楡煑濃汁日洗二次千金翼方本草綱目○

蕭炳云今方用共櫸皮同療赤白痢四聲本草大觀本草○

發明炳曰同櫸皮治赤白痢四聲本草本草綱目○

地楡一名玉豉陶景注云子黑如豉故以名之一名玉札文一名玉

豉文一名金玉之香華一名酸母越人呼之地楡者熒惑

之精也出大清經和名阿也女多年一名衣比須祢本草和名

臣禹錫等謹按藥性論云地楡味苦平能治産後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血痢餘膿蜀本草掌禹錫按○大觀本草

【地】元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也從土也聲臣鍇曰通論詳矣田至反

【楡】木白枌從木俞聲羊朱反說文解字通釋

大和國地楡十六斤○攝津國地楡二斤○尾張國地楡十斤○參河國地楡一斤○安房國地楡二斤○近江國地楡四斤二兩○丹波國地楡九斤○出

雲國地楡一斤○美作國地楡六斤○備前國地楡三斤○備中國地楡一斤○紀伊國地楡三斤○讃岐國地楡十斤 延喜式

地楡 陶隱居本草注云地楡一名玉豉 和名阿夜女太無一云衣比須祢 子黒似豉故以名之 和名類聚鈔

〔主治〕止冷熱痢疳痢極效 〔開寶〕開寶本草○本草綱目

日華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩産前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採 日華本草○大觀本草

〔主治〕止吐血鼻衄腸風月經不止血崩産前後諸血疾并水瀉 大明 日華子大明○本草綱目

圖經曰地榆生桐栢及寃句山谷今處處有之宿根三月内生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色開花如椹子紫黑色外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人乏茗時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煑半頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作

乃愈小兒疳痢亦單煑汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煑取一升半去滓再煎如稠餳絞濾空腹服三合日再圖經○大觀本草

〔集解〕頌曰今處處平原川澤皆有之宿根三月內生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根〔發明〕頌曰古者斷下多用之蘇頌圖經○本草綱目

江寧府地榆　衡州地榆〔二月八月採根暴乾〕〔備急本草圖拔〕

地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢卽未可輕使〔本草衍義○丹波元胤訂正重雕宋本〕

衍義曰地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢卽未可輕使〔本草衍義○大觀本草〕

〔發明〕宗奭曰其性沉寒入下焦若熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢卽未可輕使〔本草衍義○本草綱目〕

本草經曰地榆止汗氣消酒明目　廣志曰地榆可生食　神農本草經曰地榆苦寒主消酔生寃句〔太平

御覽

地榆氣微寒味甘酸苦而酸氣味俱厚陰也珍云陽中微陰治下部血○張元素珍珠囊湯液本草

根〔氣味〕元素曰氣微寒味微苦氣味俱薄其體沉而降陰中陽也專主下焦血○張元素本草綱目

〔象云〕治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆〔心云〕去下焦之血腸風下血及瀉痢下血須用之李東垣藥類法象○湯液本草

根〔氣味〕杲曰味苦酸性微寒沉也陰也〔主治〕治膽氣

不足李杲李杲草綱目○本

地榆味苦甘酸性微寒無毒沉也陰也其用有二主

下部積熱之血痢止下焦不禁之月經地榆醫血藥

連梢不注紅地榆止血痢宜然地榆味苦甘酸微寒

無毒惡麥門冬止痛排膿治金瘡女人帶下良○下

部見血用地榆地榆療崩漏止血止痢李杲藥性賦

無名印地榆輟耕錄

地榆生桐栢山及冤句山谷今處處有之密縣山野

中亦有此多宿根其苗初生布地後擴葶直高三四

尺對分生葉葉似榆葉而狹細頗長作鋸齒狀青色開花如椹子紫黑色又類豉故名玉豉其根外黑裡紅似柳根亦入釀酒葉燒作灰能爛石味苦甘酸性微寒一云沉寒無毒得髮良惡麥門冬　救飢　採嫩葉煠熟用水浸去苦味換水淘淨油塩調食無茶時用葉作飲甚解熱救荒本草○農政全書

地榆生桐栢山及冤句山谷今處々有之密縣山野中亦有此多宿根其苗初生布地後擴葶直高三四尺對分生葉葉似榆葉而狹細頗長作鋸齒狀青色

開花如椹子紫白黑色又類豉故名玉豉其根外黑

裏紅似柳根亦入釀酒葉燒作灰能爛石味苦甘酸

性微寒一云沉寒無毒得髪良惡麥門冬【救飢】採嫩

葉煠熟用水浸去苦味換水淘淨以油塩調食無茶

時用葉作飲甚解熱【治病】具見救荒本草○【本草】古今醫統

地榆味苦甘酸氣微寒氣味俱薄陰中陽也無毒山

谷俱有生長八月採根曝乾惡麥門冬宜人頭髪雖

理血病惟治下焦止婦人帶下崩中及月經不斷卻

小兒疳熱瀉痢致積瘀時行寒痔瘻來紅禁腸風下

血散乳痓愈金瘡因性沉寒故諸血熱者可用倘若虛寒水瀉冷痢切宜忌之　第一卷五加皮欵後
按宜參看本草蒙筌

地榆味苦甘酸性微寒無毒入大腸肝二經主下部積熱之血痢止下焦不禁之月經又主金瘡除惡肉崩中帶下得髮良惡麥門冬　按地榆沉寒屬陰專入肝腸以理下焦血症有熱者宜之若虛寒下陷血衰泄瀉者勿用鴞補雷公炮製藥性解

〔釋名〕酸赭〔時珍曰〕按外丹方言地榆一名酸赭其味

酸其色赭故也今蘄州俚人呼地榆爲酸赭又訛赭爲棗則地榆酸赭爲一物甚明其主治之功亦同因併別録有名未用酸赭爲一云【主治】汁釀酒治風痺補腦擣汁塗虎犬蛇蟲傷時珍【發明】時珍曰地榆除下焦熱治大小便血證止血取上截切片炒用其稍則能行血不可不知楊士瀛云諸瘡痛者加地榆癢者加黄芩本草綱目

地榆味苦微酸氣寒無毒沉而降陰也入足少陰厥陰□足陽明經陶隱居曰生桐栢及寃句山谷今處處平原川澤亦有三月宿根布地作

苗獨莖直上高三四尺對分出葉青色似榆葉稍狹細而長邊有鋸齒七月開花如椹九月采根根似柳外黑內紅根可釀酒山人乏茗摘葉亦可作飲或作蔬用○地榆苦寒凉血止血之藥也達下焦止腸風下血痔痢之紅消熱腫治諸瘻惡瘡乳癰之疾其性苦寒酸收療一切熱散氣流而動血者故他書有吐衄溺血月經妄行或中酒熱及小兒疳熱積痢兼可收治總因血熱爲害也若脾胃虛寒泄瀉癰瘡久病無火并陽衰血證並禁用之○集方治腸風下血穀道痛癢不止用地榆一兩蒼术五錢米泔浸一宿水二碗煎八分食前服○治結

陰下血腹痛不已用地楡四兩炒甘草炒砂仁炒炮薑灰各一兩共為末每服五錢白湯調服○治吐血衂血或溺中帶血或糞前後見血用地楡五錢懷熟地三錢當歸白芍藥各二錢如吐血本方加牡丹皮茜草各二錢便血加蒼朮炮薑灰各三錢俱用水二大碗煎服本草彙言

地楡 一名玉豉一名玉札一名酸赭蘄州呼為酸棗平原川澤皆有之宿根三月內生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉葉似楡葉而稍狹細長似

鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根味苦微寒無毒消酒止渴補腦明目止膿血除惡肉療金瘡此草霧而不濡太陽氣盛也鑠金爛石炙其根作飲若茗取其汁釀酒治風痺○典故尹公度曰寧得一片地榆不用明月寶珠　西域眞人曰何以得長壽食石用玉豉　地榆與五加煮食之可成神仙群芳譜

地榆味苦甘酸氣微寒陰中陽也無毒止婦人赤帶崩下及月經不斷却小兒疳熱止熱痢下瘀血治腸

風下血愈金瘡但治熱而不治寒虛寒之人不可輕用地榆凉血之品也血熱病生用之凉血正得其宜然血熱乃必動動則必有散失之虞血寒則必凝凝則必有積滯之患過用地榆以凉血則熱變爲凉陰寒結于腸胃將腹痛之症生反致血崩下血而不可止猶以爲地榆之少也更佐之以凉之藥勢必至死亡而後已良可嘆也○或問地榆治大腸之血寒有奇功新舊皆可用之否曰不可也大腸有火則新舊皆宜無火乃新舊皆忌此言其常也大腸前有火而

後無火則前宜而後不宜久無火而暫有火則久當忌而暫不宜忌此言其變也審常變而察可否豈特用地榆一味爲然哉○或問地榆涼大腸之血單用一味徃徃見功而合用他藥反致無効何也蓋單用一味則功專而効速合用他藥未免拘牽矣倘所用他藥盡入大腸之經則調和于寒熱之間賛勷于氣血之內功既速成而身又甚健惟其所用之他藥非盡入于大腸經之味乃彼此異宜上下違背安能奏功乎可見用藥貴純而不貴雜不在單用與不單用

也○或疑地楡凉血何以能止血也不知地楡之能補血也倘徒凉血則血止不能環正惟其凉血又兼補血所以單味又能成功耳本草新編

地楡　無名印 事物異名

地楡　외ㅣ느믈불휘 性微寒 一云平 味苦甘酸無毒主婦人七傷帶下病及產後瘀痛止血痢排膿療金瘡○生山野葉似楡而長花子紫黑色如豉故一名玉豉根外黑裏紅二月八月採根暴乾 本草○性沉寒入下焦治熱血痢去下焦之血腸風及瀉痢下血須

用之陽中微陰治下部血湯液東醫寶鑑

地榆　苦酸微寒性沉而濇本草未嘗言濇然能收汗止血皆酸歛之功也入下焦除血勢治吐衄崩中血虛腸風血鮮者爲腸風隨感而見也血痢者爲藏毒積久而發也糞前爲近血出腸胃糞後爲遠血出肺肝血痢蘇頌曰古方斷下多用之寇宗奭曰虛寒瀉痢及初起者忌用之　似柳根外黑裏紅取上截炒黑用稍反行血得鬢良惡麥冬增訂本草備要

地榆稟地中陰氣兼天之微陽氣薄味厚沉而降陰也入肝腎大小腸經沉寒入下焦故主下部溼熱諸病止純血痢疳痢腸風極效皆寒能涼血洩熱袪溼

之功　得金銀花等分炒黒佐芍藥甘草枳殻黄連
烏梅治血痢如熱在心經下利純鮮血加磨犀角汁
神効　性寒下行凡脾胃虚寒作泄白痢久而胃弱
胎産虚寒泄瀉血崩脾虚作泄法並禁用本草經疏輯要
菭蒢　博雅菭蒢地榆也　玉䜀　詞林海錯王屋
山人云何以得長壽食石用玉䜀玉䜀地榆也可以
煮石　酸赭　本草綱目地榆一名酸赭其味酸其
色赭故也　無名印　清異録候寧極藥譜無名印
地榆也事物異名録

地〔眞濁〕徒利切音第地在天之氣中順承天施而成物也〔揄〕〔虞清濁〕雲俱切音于地揄藥名字彙

〔地〕他計切音第地在天之氣中順承天施而成物也

篆作埊籀文从隊作墬別作坔埊同文舉要改作𡉏

篆作垂今不從〔揄〕芊㔽切音余地揄草名初生布地

獨莖直上葉似揄稍狹細花紫黑色根外黑裏紅似

柳根一名玉豉又名酸赭味酸色赭故也葉作飲代

茶解熱根可釀酒正字通

地〔廣韻〕徒四切〔集韻〕大計切〔韻會〕徒二切〔正韻〕徒利

切竝音第説文元氣初分重濁陰爲地萬物所陳列

也楰唐韻羊朱切集韵容朱切正韻雲俱切竝音俞

地楰草名博雅菗蒢也康熙字典

原地楰一名玉豉本草註云其葉似楰初生布地故名其子紫黑色如豉故又名玉豉

一名玉札一名酸赭蘄州呼爲酸棗綱目云外丹方地楰一名酸赭

以其味酸其色赭故也俗又訛赭爲棗處處平原川澤皆有之宿根三

月内生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉

葉似楰葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如

椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根味苦微寒無毒消

酒止渴補腦明目止髖血除惡肉療金瘡此草霧而不濡大陽氣盛也燒作灰能鑠金爛石故道家煮石方用之炙其根作飲若茗取其汁釀酒治風痺禾其葉作飲亦好又可煠食〔彙考〕〔原〕〔東華眞人煮石經〕昔西域眞人王屋山人王常言何以得長壽何不食石用玊豉玊豉者卽地榆也　昔尹公度聞孟綽子董子固共相與言曰寧得一斤地榆安用明月寶珠廣群芳譜

地榆重修鎮江府志

藥之屬有地榆其葉可代茗内則云三月采榆錢可作羹瀹過曬乾可爲醬財貯至冬至可釀酒其白皮又可爲麪西域真人曰何以得長壽食石用玉豉尹公度曰寧得一片地榆不用明月實珠錢塘縣志

藥類　地榆遂安縣志

地榆其葉可代茗内則云三月採榆錢可作羹瀹過曬乾可爲醬財收貯至冬可釀酒其白皮又可爲麪杭州府志

酸棗　味酸平深州府志

地楡〔和名〕也末布志（ヤマフシ）今按ニ乃古岐利久佐（ノコキリクサ）〔増補異名玉豉〕

酸赭 多識編

地楡 ノヅチ又シヒモノ 枕藻塩草

地楡甘酸苦寒宜生用見火無功悪麥門冬伏丹砂雄黄硫黄此草名ニ歪列木高也（ワレモカウト） 本草喉襟

地楡ワレモカウ也京ノ大坂ノ植木屋ニアリノコギリ草ヲ地楡トスルハアヤマリ也別ニワレモカウト云物アリ芒類ナリ花如穂似荻花ニ 大和本草

地楡（ワレモカウ） 酸赭 玉豉並ニ同シ 和爾雅

地楡　王豉　酸赭　和名阿夜女太無一云衣比須祢俗云

本綱地楡處處平原川澤皆有之宿根三月内生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉其葉似楡葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根其根燒作灰能爛石故煑石方用之之茗時采其葉作飲亦好又可煠茹

根氣味微苦酸微寒氣味共薄　沉而降陰中陽也除下焦熱治大小便血證止血取上截切片炒用其稍則能行血　若虛寒人及水瀉白痢卽未可輕使惡麥門冬

治代指腫痛單煮地榆作湯漬之半日愈△按地榆
多用倭出金剛山者良高一二尺葉似小梅葉而小
夏開花紫色千瓣圓似楊梅及千日紅狀（倭漢三才圖會）
地榆春宿根ヨリ生ス芒ノルイナリ秋穗ヲ出ス
草花ニハワレモカウト云根ハ藥種ノ地榆ナリ
秋ノ末穗ヲ切リ日カゲニ枯シテ立花ノ下草ニ
ヨシ（廣益地錦抄）
地榆【釋名】弘景曰其葉似榆而長初生布地故名【修
治】二八月采根去蘆頭剉用○宗奭曰止血取上截

切片炒用其梢則能行血〔氣味〕苦寒無毒〔能〕主下部積熱之血痛止下焦不禁之月經一切吐血衄血腸風便血婦人血崩帶下一十二病胎前產後諸般血疾及婦人乳痓硬痛消酒止渴補絶傷治諸瘻惡瘡熱瘡〔毒〕惡麥門冬虛寒冷痢及脾胃水瀉白痢者不可輕投且熱痢亦卒不可用澁留早則卻有害也〔修治〕本書ノ如シ○諸瘡ノ痛ニコレヲ加フ痒キニハ黃芩ヲ加フナリ○灰ニ燒テヤケドニ付テヨシ 片玉六 八本草

地楡　和名　ヤマランン　又ノコギリサウ　所所原野ニ多ク有之地ニ付テ生ス葉ハ楡ノ木ノ葉ニ似タリ故ニ地ノ楡ト云義ナリ秋ニ至テ末ニ桑椹ノ如キ黒キ花ヲ付ク子モ其中ニアリ根ハ漢來ノモノト相同シ和産モ藥用ニ用ナリ本草

花繪　花蒔繪

地楡　和ヲ用ユ和名ワレモコウ葉似楡葉實似桑椹木香ノ類ニアラズ不可以名相似混之又延年花肆ニ苅萱ヲ名テワレモコウトス甚別ナリ

不可以名同誤用 無名印地楡 玉豉 列女傳引古謠云云出揚升庵古今諺食石食金塩可以支長久食石食玉豉可以得長壽注金塩五加皮也玉豉地楡也ワ

アトロアキリモウニヤ 地楡草ノ水也主治疵腫物ニ吉 阿蘭陀水薬ナリ 用薬須知

地楡 ワレモコウ 世人蜜香ヲワレモコウト云ハ誤也木香ヲ又蜜香氏云賀茂アリカ池ノ溝ニ有リ性温ヲ好ミ旱地ニ生形桑椹ニ似テ赤花ヲ着地楡ハ花紫ニメ平澤ニ生ス然レハ二草ヲ別ニハ山澤ト花ノ紫赤トヲ可別賀云ス、キノ

コヲモワレモコウト云又別物ナリ本草會誌

地楡　ワレモコウ葉大小又脚葉ノ有無等多シ花ニモ紅白二色等アリ玉鼓トハ形ノ似タルヲ云ナリ信州ノ高トウ邊ニテ升麻ト云古ハ多ク升麻ニ混セリ長升麻ノ中ニアリ可擇ト先人云ヘリ救荒本草臆斷

地楡　和名ワレモカウ處々ニ多シ花紫色ナリ

○一種白花ノモノアリ葉細小花長寸餘ニノ細シ以上二種皆下品ニメ不堪藥用○漢種上品

享保中種子ヲ傳テ今官園ニ多シ葉大抵和産ト同シテ又別ニ小樗葉アリ和産ハ樗葉ナシ根ノ狀沙參防風ノゴトク直根ニメ軟ナリ年ヲ經タルモノ旁根生ズトイヘ𪜈皆下ニ向フ和産根横ニ出テ紫黒色ニメ堅剛ナルニ異ナリ譬バ朝鮮參ト和ノ竹節參ノゴトシ功用優劣辨ヲ待ズメ明ナリ物類品隲

地楡 アヤメタム和名鈔 エビス子同上 シヒモ

ノマクラ古哥 ノヅチ同上 ワレモカウ ダンゴ

イタヾキ江州　ダンゴバナ勢州　ノコギリサウ
ノカヘリ石州　キウリグサ日州　ボウズバナ和州
ノコギリグサ江州　テンピサウ紀州花色赤キ故ニ名ヅク和方書
ニ天皮草トイフ竹ノ青皮ナリ
一名　無名印輟耕録　王札群芳譜
豚楡係石藥爾雅　菰菜郷藥本草　ワレモカウニ同名
多シ麝草蒼朮カルカヤニ似タル草皆ワレモカ
ウノ名アリ　諸州皆アリ山野向陽ノ地ニ生ズ
一窠數十葉叢生ス形紫藤葉ニ似テ大ニシテ鋸齒
アリ楡葉ノ如シ夏月叢葉中ヨリ數葶ヲ出ス高

サ四五尺葉互生ス葉間ゴトニ枝乂ヲ分ツヿ長シ其端ニ細花簇リ梀ヲナス長サ六七分濶サ三四分形筆頭菜(ツクヅクシ)ノ如シ又重層ノ生ズル者アリ赤紫色ノ者多シ又紅色ナル者粉紅色ナル者白色ナル者アリ白色ナルモ粉紅色ナル者モ穗長ク葉モ細長ク苗高サ六七尺ニ過(スグ)白花ハ筑前ニ多シ粉紅花ハ江州湖邊ニ多クアリ此外數品アリ

此根ヲ採日乾シ搥碎キ艾絨ノ如クニノ甕器(セトモノ)ニ灸ノ孔ヲ穿ツベシ舶來ノ者ハ直根ナリ和産

多クハ横生ソ硬シ下品ナリ國ニヨリ直根ナル
モアリ粉紅花白花ノ者ハ直根ナリ享保年間ニ
渡リシ唐種ハ根柔直ニソ防風根ノ如シ上品ナ
リ本草綱目啓蒙

王鼓　一名地楡　ワレモカウ　比叡山鞍馬及
ヒ近道處處山野ニ生ス蘇頌圖經本草ニ云今平
原川沢ニアリ宿根ヨリ二月ノ中ニ苗ヲ生ス初
生地ニシク獨莖直上高サ三四尺對シ分テ葉ヲ
出ス楡ノ葉ニ似テ稍狹ク細長ニソ鋸ノ歯ノ狀

ニ似テ青色七月花ヲ開ク樝ノ子ノ如クニシテ紫
黒色根外黒ク裏紅ニシテ柳ノ根ニ似タリ今按
ニ花ニ紅白ノ二種アリ花暈
地榆　無文印ワレモカウ和薬○無文印　チユナ
リ○玉豉　チユナリ○酸赭　チユナリ薬品手引草
地榆　和名ダンゴイタヾキ高野一名ボウヅハナ
先君子名ケテ　クサニレト云処々ニ生ス山
城蟻ガ池邊多ク生ズ葉ニレニ似タリ一種天飛
草アリ紀伊高野山ニ生ス葉側生シ花紅ナリ是

亦地楡ノ類ナリ地楡根クサニレノ子地楡汁ク
サニレノシル千金方薬註
地楡　和名ノコギリクサト云甚誤レリ俗名ワ
レモカウ是ナリ處々山野甚多シ本草正譌
地楡本經　按直指方惡瘡方白礬五倍子黄栢黄連
黄丹海螵蛸貝母等分為末入麝香少許摻痛則加
地楡癢則加苦參東壁引楊士瀛云諸瘡痛者加地
楡癢者加黄芩而不載本方及省略不詳使讀者以
為服用之法今正之苦參作黄芩亦傳寫誤矣本草鈎衍

地楡 〔和名〕アヤメタム 和名鈔 本草和名 エビスネ

同上 ノヅチ 共ニ古歌 シヒモノミクラ 共ニ古歌 ワレモカウ 武蔵野ノワレモカウト云モモハ莣麥ニノ別物ナリ ツシヨンネ 蝦夷ニテ紅花ノモノヲ云白花ノモノヲシウキナチイト云フ ピムピネルラ 和蘭

〔漢名〕一名玉札 群芳譜 綱目集解蘇頌ノ説ノ地楡ナリ隨地山野ニ多シ葉ノ形楡ニ似テ大ニメ長ク八葉或ハ十一葉對メ一葉ヲナス秋莖高三四尺稍ニ花穗ヲ生ス大イサ指ノ如ク一寸餘アリ紫黒色ノモノ多シ蘭山云白花ノモノ筑前ニ

アリト云西湖云武藏隅田川ノ産ハ葉細ク花白ク漢種ノモノト同ジト云云白花ノモノハ花穂長クテ下垂ス其餘淡紅花ノモノ紅花ノモノ等數品アリ紫黒花白色共ニ根形丹參ニ似テ硬ク皆横ニ生ス下品ナリ近年賀州白山ヨリ一種ノ地楡ヲ産ス葉形紫黒花ノ物ニ似テ甚肥大ニメ粉緑ヲ帯フ花ヲ生スル早ク初夏莖ヲ抽テ一尺餘穗甚長ク三四寸下垂ス紅花ニメ七八分紅蘂ヲ吐出スルヿ常ノ品ニ異ナリ形纖産ノヒンプ

ル子ルレノ穗ニ似リ根肥テ短ク軟ニメ上品ナリ又此類ニ信州ヨリ産スル春ザキノ地楡ト云俗ニカライトサウト呼フモノアリ加州産ヨリ稍短メ粉緑色花ノ形同メ鮮紅愛スヘシ根ハ蝦夷産ト同ク直根ニメ肥テ軟ナリコノ二種ハ和漢ノ絶品藥用上品ナリ武州秩父ノ産モ直根ニメ葉アツク短ク信州産ニ次ク又一種ヲランダ地楡蠻名ヒンプルレ子ルレハ葉小ニメ花穗短クメ直根ナリ子黄色ニメ皺アリ葉味苦シ是胡蒼

耳也救荒本草通解

地楡　一名玉札羣芳譜　和名アヤメタム本草和名　和名抄　エビス不同上　同上「ノヅチ」「シヒモノマクラ」共ニ古歌　ワレモカウ武藏野ノワレモカウト云モノハ芒類ニメ別物ナリ　ツシヨンネ蝦夷ニテ紅花ノモノヲ云白花ノモノヲシウキナチイト云フ

蠻名

ビムピネルラヒンプルレト云ハ誤ナリ　山野ニ多シ陽地ニ生ス葉ノ形檞楡ニ似タリ又紫藤葉ニ似テ圓ク鋸齒アリ一莖ニ八九葉對生ス秋月莖高サ三四尺梢ニ枝ヲ分チ花穗ヲ生ス形椹ニ似テ紫黒色

又武州戸田志村ノ産ハ葉狹ノ長ク花白色又長ク花ノ末下ニ垂ルコレヲ漢種ト云ハ非ナリ其餘紅花ノモノ淡紅花等アリ根ノ形手ヲ開キタル如ク一根指ノ大サニメ横生ス枯燥シテ堅シ下品ナリ近年一種ノ地楡アリ加州白山ニ生ス葉ハ紫黒花ノモノニ似テ肥大頗白色ヲ帯ブ四五月高サ二尺許梢ニ花アリ水楊花ニ似テ紅紫色下垂シ本ノ方ヨリ開キ紅絲ヲ帯ル甚美也根ハ横生セズシテ直根ニシテ軟ナリコノ一種ニ

信州ヨリ産スルカライトサウト呼モノハ葉短ク白色ヲ帯ビテ高サ一尺餘紅絲ヲ垂テ開ク愛スベシ穂ノ先ヨリ開キ下ルコノ二種ハ直根ニメ他種ニ勝レリコレ綿地楡也藥用ニ入ベシ又一種ピムピネルラト呼ベキヲ俗ニヒンブルネルレト称スルモノアリ葉細ニメ委陵菜(カハラサイコ)ノ如ク花圓ニメ短ク紅絲ヲ帯ブ是又直根ナレ氏瘠小ナリコレ救荒本草ノ胡蒼耳ナリ 本草穿要

地楡 ピムピ子ルラ 喝蘭 蠻種渡リ今世ニ多シ

子ヲ下シテ生ジ又宿根ヨリモ生ス葉ハ委陵菜ニ似テ圓ミアリワレモカウニ似テ小ナリ花モワレモカウニ似テ紅色縧ノ如キ紅色ノ蘂ヲ吐出ス根直下シテ軟ナリ此品ハ即救荒本草ノ胡蒼耳ナリ○一種　加州白山ニ産ス葉ワレモカウヨリ長大ニシテ粉緑色花穂長シテ垂レ紅色ノ長蘂ヲ吐出ス本ヨリサキ上ル○カライトサウ信州葉短ク粉緑色花色薄ク本ヨリサキ下ル紅縧ヲ垂ルガ如シ以上三種根柔ニシテ即綿地楡ナ

リ○一種　ワレモカウ一葉ノ形柳楡（アキニレ）ニ似テ花ノ形ハンノ木ノ實ニ似テ紫黒色ナリ○一種細葉白花ノモノ武州志村ノ産ナリ（本草圖譜）

地楡（本草）　和蘭ニテピンピ子トイフ山ノ赤土ニ植テヨシ糞ヲ澆キテ勢ニシ花ニ白ト紅ト種々アリ和蘭ニテ根ヲ脉管纖緯ノ弛弱ニ用フ種類多シ（草木育種）

バウズグサ　地楡大和［本綱十二］○ダンゴイタヾキ　地楡［伊吹］○ダンゴバナ　同上［勢州］○ノコギリグサ　地楡［江州］○ノコギ

リサウ同上○ワレモカウ 地楡 本綱十二 所々山野ニ生ス一根叢生葉深色
紫藤ノ如ク鋸歯有リ一枚ヲハナセバ楡ノ葉ノ如夏薹ヲ抽デ、三四尺葉互生ス秋ニ至リ紫黒
ノ碎花穗ヲ作ス後實ヲ生〆桑ノ實ニ似タリ此根ハ皆横生ニ〆堅硬下品モノナリ一種淡紅花ヲ
開モノアリ其根柔軟ニ〆藥用ニ上品ナリ○エビスネ 衣比須祢 地楡 和名鈔 ○エビ
スグサ 衣比須久佐 地楡 医心方 ○テンピサウ 地楡 本綱十二 紀州 ○アヤメ
タム 阿夜女太無 地楡 和名鈔 ○キウリグサ 地楡 本綱十二 日州 ○ヒンプル
子ルレ 地楡 蠻産ノ本草藥名備考和訓鈔

地楡 ワレモコウ 秋咲野生多シ葉小ニ〆二
レノ葉ニ似タリ高三四尺枝多シ淡紫花ヲ開ク

楊梅實ノ如シ又漢種アリ葉小ニシテコハク秋白花ヲ開花微ニ長シ又夷狄ノ産花深紫ニシテ長三四寸下垂ス糸ヲ垂タルカ如ク見コト也夏ヒラク葉モ大ニシテ粉色アリ又加州ノ産葉ハエゾヨリ小ナレ𪜈花相同春ノ末ヨリ花出テ夏迄アリ甚佳シ又胡蒼耳ト云アリ蠻名ピンプル子ルレ葉コトカニシテ切込花形モ相似タリ甚枝多シ花出レバ根枯ル舊説直根ノ地楡ト云（百花天工匯別）

地楡（綱目）玉豉（同上）無名印（輟耕録）玉札（群芳譜）茂菜（鄉藥本草）豚

楡薬石酸楮綱目天皮サウ高野ダンゴイタヾキ伊吹ボ
ウヅバナ大和ノコギリサウ　ワレモカウノ名ア
ルモノ數品アリ蒼朮麝香草外ニ一種カルカヤ
トツヾキニ云ワレモカウ是ミナ同名ナリ地楡
ハ山野下濕ノ地ニ多シ一根數莖生ス葉ノ廻リ
ニ跡キキレコミアリ中ヨリ莖ヲ生ス四五尺餘
ニモ至ル葉ノ形ハ藤ノ葉ニ似タリ大サモ大抵
相似タリ葉ノ間ヨリ枝出ヅ七八寸ニモナリ末
ニ花ヲツク形土筆ノ如ク穗ニナリテ紅紫色又

ウス赤キモアリ穗重臺ニナルモアリ又白花モ
アリ白花ハ細葉ナリ　四季賞花集

地楡　延喜式云夷草俗云和禮毛加于紀伊高野方言天火草俗云鋸草葉如楡花有紅白二等子如梂子根塊紫色今藥舖中者出於武藏處澤又有一種莖葉軟弱者傳言是蠻種按救荒本草所載胡蒼耳也　本草綱目纂疏

ワレモカウフクリン○地楡宿根○白フクリンホソクカヽル○二品アルウチ此品ハ近在野原ノシナユヘ葉丸ガタ小サシ南部邊ノ品ハ大葉ニテ花モチガフ」

増一名 藷蒢 博雅 重修本草綱目啓蒙
胡蒼耳 救荒本草ピンプル 子ルレ又尚可考 多識正名
ワレモカウ ダンゴイ タヾキ 地楡 玉札譜芳 ○タウウチ
サウ 地楡一種 物品識名
地楡根 ワレモカウ 舶来ノモノ上品ナレ氏今サナ
シ 和産ノモノ多ク八根硬シ下品ナリ薬舗ニ
多シ 日用薬品考
地楡 アヤメタム 和名鈔 エビスグサ 同上 ワレ

モコウ 同名多シ　山野向陽ノ地ニ多シ一窠數十葉叢生ス紫藤葉ニ似テ鋸齒アリ夏月叢中ヨリ莖ヲ抽ク高サ四五尺葉互生ス葉間ニ枝乂ヲ分チ赤紫色ノ細花聚リ毬ノ如シ長サ六七分濶サ三四分形筆頭菜ノ如シ又重層メ生スルアリ一種紅色者粉紅色者白色者アリ又葉細長ニメ白粉ヲ帶ルガ如キアリ莖高ク六七尺ニ至ル花穗モ亦長ク三四寸是ヲ　ナゲサヤクサト云東北ノ地ニ産ス　救荒本草啓蒙

地楡（ツチハリ）　無名印　玉札　享保年中渡ルトコロノ

種ハ直根ナリ　手板發蒙

玉豉（ワレモカウ）　※湘王鐸金樓子　一候續齊

本草通串卷三十

本草通串卷三十一

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

丹參

丹參味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣一名郄蟬草○神農本經大觀本草

丹參上品本經【釋名】郄蟬草本經【主治】心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣本經神農本經

○本草綱目

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣神農本經○千金翼方

丹參味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣　郄蟬草神農本經○盧復手錄

丹參味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣神農本草經疏○吳懷祖輯要

丹參味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣神農本草經○百種録

丹參味苦微寒無毒主養血去心腹痼疾結氣腰脊强脚痺除風邪留熱久服利人一名赤參生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾名醫別録○大觀本草

【釋名】赤參別録

【集解】別録曰丹參生桐栢川谷及太山五月采根暴乾

【主治】養血去心腹痛疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人別録名醫別録○本草綱目

丹參味苦微寒無毒主養血去心腹痼疾結氣腰脊

強脚痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤
參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴
乾（名醫別錄○千金翼方）
〔月〕巴越之赤石也象釆丹井丶象丹形凡丹之屬皆
从丹（都寒切）〔𠁿〕（古文丹）〔彬〕（亦古文丹 說文）
吳氏本草曰丹參一名赤參一名木羊乳一名郄蟬
草神農桐君黃帝雷公扁鵲苦無毒李氏大寒岐伯
鹹生桐柏或生太山山陵陰葉華小方如荏有毛根
赤四月華紫三月五月採根陰乾治心腹痛（吳普本草○太）

平御覽

【釋名】赤參吳普

【集解】普曰莖葉小房如荏有毛根赤色四月開紫花二月五月采根陰乾【根】【氣味】普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯鹹李當之大寒吳普本草

○本草綱目

陶隱居云此桐栢山是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼爲逐馬酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐爲謬矣神農本草陶弘

景註○大觀本草

〔釋名〕逐馬弘景〔集解〕弘景曰此桐栢在義陽是淮水發源之山非江東臨海之桐栢也今近道處處有之莖方有毛紫花時人呼爲逐馬〔根氣味〕弘景曰久服多眼赤故應性熱今云微寒恐謬也〔主治〕漬酒飲療風痺足軟弘景神農本草陶弘景註○本草綱目

畏鹹水反藜蘆藥對○大觀本草

〔根氣味〕之才曰畏鹹水反藜蘆藥對○本草綱目

藥性論云丹參臣平能治脚弱疼痺主中惡治百邪

鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精藥性論○大觀本草

〔根〕〔氣味〕權曰平〔主治〕主中惡及百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精甄權藥性論○本草綱目

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾千金翼方

牽牛　逐馬丹參一名逐馬 騈香麗艶

唐本注云此藥冬採良夏採虛惡唐本注○大觀本草

集解 恭曰冬采者良夏采者虛惡唐本注○本草綱目

蕭炳云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草

曾用有効四聲本草○大觀本草

釋名 奔馬草炳曰丹參治風軟脚可逐奔馬故名奔

馬草曾用實有效四聲本草○本草綱目

迩二古ㇿ多ㇳ 味苦久香之 无毒九月採根日尓乾而用

大同類聚方

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似紫蘇有細毛花紫

亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根蜀本草掌禹錫按○大觀本草

丹參一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳一名逐馬出陶景注又小品方云人病腰痛服之則能起走逐馬故以名之一名鹿服出雜要訣唐又殖美濃國本草和名

〔冃〕巴越之赤石也象采丹井丶丹形也凡丹之屬皆從丹臣鍇曰史記曰寡婦清其先得丹穴而富也穴即井也荀卿曰南有曾青丹子山海經有白丹黑丹丹以赤爲主黑白皆丹之類非正丹也得干反〔凵〕古

文丹說文解字通釋

美濃國　丹參十四斤○相摸國　丹參四斤○武藏國　丹參廿五斤延喜式

日華子云養神定志通利關脉絡冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩滯下調婦人經脉不匀血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱温狂悶又名山參日華大明○大觀本草

〔釋名〕山參日華〔主治〕養神定志通利關脉治冷熱勞骨

節疼痛四肢不遂頭痛赤眼熱温狂悶破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不匀血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒排膿止痛生肌長肉〔大明〕日華子大明○本草綱目

圖經曰丹參生桐栢山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡圖經○大觀本草

〔集解〕頌曰今陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高一尺許莖方有稜青色葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花成穗紅紫色似蘇花根赤色大者如指長尺餘一苗數根蘇頌圖經本草綱目○

隨州丹參　五月採根暴乾備急本草圖拔

丹參葉如薄荷花如蘇曰郄蟬草曰赤參曰木羊乳曰山芩本草作參曰奔馬俗謂之逐馬言驅風之駃也昆蟲草木略

〔諸藥相反例〕〔藜蘆〕反　丹參○〔丹參〕味苦微寒無毒

除積聚破癥瘕益氣去煩滿一名赤參李杲藥性賦

丹參　味苦氣微寒無毒山谷有在處多莖方稜長尺餘青色葉相對似蘘荷有毛花紅紫夏開根麄長冬採畏寒水石也反藜蘆專調經脉等善理骨節痛生新血去惡血落死胎安生胎破積聚癥堅止血崩帶下脚痺軟能健眼赤腫可消散癭贅惡瘡排膿生肉辟精魅鬼祟養正敺邪更治腸鳴幽幽滾下如走水狀本草蒙筌

丹參味苦性微寒無毒入心經養神定志破結除癥

消癰散腫排膿止痛生肌長肉治風邪留熱眼赤狂悶骨節疼痛四肢不遂破宿血補新血安生胎落死胎理婦人經脉不調血崩帶下　按丹參色赤屬火味苦而寒故入手少陰經以療諸般血症鎸補雷公炮製藥性解

【釋名】時珍曰五參五色配五臟故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎曰黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心曰赤參其苦參則右腎命門之藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義爾【集解】時珍曰處處

山中有之一枝五葉葉如野蘇而尖青色皺毛小花
成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉紫〔主治〕活血
通心包絡治疝痛時珍〔發明〕時珍曰丹參色赤味苦氣
平而降陰中之陽也入手少陰厥陰之經心與包絡
血分藥也按婦人明理論云四物湯治婦人病不問
產前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治
與之相同蓋丹參能破宿血補新血安生胎落死胎
止崩中帶下調經脉其功大類當歸地黃芎藭芍藥
故也本草綱目

丹參味苦氣微寒無毒色赤氣平而降入手少陰厥陰心與包絡血分藥也李時珍曰五參五色以配五藏故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎曰黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心曰赤參其苦參則命門之藥也○生陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高尺許莖方有稜一枝五葉葉對生葉如野蘇而尖皺青色有毛三月至八月開小紫花成穗如蛾形又似紫蘇花○中有細子一苗數根大如指長尺許皮丹肉紫

丹參善治血分去滯生新調經順脉之藥也主男婦吐衄淋溺崩血之證或衝任不和而胎動欠安或產後失調而血室乖戾或瘀血壅滯而百節攻疼或經閉不通而小腹作痛或肝脾鬱結而寒熱無時或癥

瘕積聚而脹悶痞塞或疝氣攻冲而止作無常或脚膝痺痿而痛重難履或心脹留氣而腸鳴幽幽或血脉外障而兩目痛赤故明理論以丹參一物而有四物之功（補血生血功過歸地調血斂血力堪芍藥逐瘀生新性倍芎藭）婦人諸病不論胎前產後皆可常用而時醫每用每効此良方也

朱東生先生曰丹參入天王補心丹則養心　同四物湯則補血調血治胎前一切病　同鼈甲玄胡牛膝乾膝赤蔘子牡丹皮除癥瘕積聚寒熱　同玄胡小茴香橘核治男子冲疝　馬端峯先生曰丹參

能破宿血補心血安生胎落死胎崩中帶下調經脉

治腰脊百節痠痛凡軟脚弱等病以酒炒末服藥平

而効驗殊異本草彙言

丹參根色赤酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故一名

奔馬并人參是爲五參其形不盡相類而主療頗同

故名丹參一苗數根赤色大如指長尺餘破積聚癥堅散癭贅惡瘡調經養血止痛破邪更治腸鳴幽幽如走水狀本草原始

丹參一名山參一名郗蟬草一名木羊乳一名奔馬

草二月生苗高尺許莖方有稜青色一枝五葉相對

如薄荷而有毛三月至九月開花紅紫似蘇花成穗中有細子根大者如指長尺餘一苗數根皮丹而肉紫味苦微寒無毒破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下破癥除瘕排膿止痛婦人明理論云四物湯治婦人諸病調婦人經脉皆可通用一味丹參散與之同功○療治　經脉不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼丹參洗淨切碎爲末每服二錢温酒調下寒疝小腹陰中相引痛白汗出欲死丹參一兩爲末

每服二錢熱酒調下群芳譜

丹參味苦氣微寒無毒入心脾二經專調經脉理骨筋酸痺生新血去惡血落死胎安生胎破積聚癥堅止血崩帶下脚痺軟能健眼赤腫可消碎精魅鬼祟養正祛邪治腸鳴又効僅可佐使非君臣之藥用之補乃補用之攻乃攻藥籠中所不可缺也其功効全在胎產之前後大約產前可多加產後宜少用自然成功多而取敗少也○或問丹參世所共用吾子又亟稱之吾恐損胃傷脾不少也是言何愛余之深也

雖然余譽丹參一乃曰僅可佐使再乃曰産後多用取敗非戒之辭乎可用而用非敎人不可用而反用也本草新編

丹參性微寒一云平味苦無毒治脚軟疼痺四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新血安生胎落死胎調婦人經脉不匀止崩漏帶下○莖葉如薄荷而有毛三月開花紅紫色根赤大如指長尺餘一苗數根九十月採根暴乾本草○酒浸服可逐奔馬故又名奔馬草酒洗晒乾用入門東醫寶鑑

丹參　赤參　郄蟬草　木羊乳　山參　奔馬草

逐馬草事物異名

丹參　氣平而降本經微寒弘景曰性應熱味苦色赤入心與包絡破宿血生新血瘀去然後新生安生胎養血墮死胎去瘀調經脉風寒濕熱襲傷營血則經水不調先期屬熱後期屬寒又有血虛血瘀氣滯痰阻之不同大抵婦人之病首重調經經調則百病散除煩熱功兼四物一味丹參散與四物湯同為女科要藥治冷熱勞骨節痛風痺不隨手足緩散不隨人丹經曰足受血而能步掌受血而能握腸鳴腹痛崩帶癥瘕音征加癥者有塊可徵瘕者假也移動聚散無常皆血病血虛血瘀之候又治目赤疝痛瘡疥腫毒

排膿生肌鄭奠一曰丹參養神定志通利血脉實有神驗 畏鹹水忌醋反藜蘆

增訂本草備要

丹參入手少陰心足少陰腎足厥陰肝三經血分之藥 入天王補心丹則補心 同牛㕮地黄黄耆黄檗則健步 同當歸牛膝細辛則下死胎 同鼈甲牡蠣丹皮青蒿延胡索牛膝乾漆水主寒熱積聚破癥除瘕心腹痼疾結氣 同麥冬沙參五味子甘草青蒿栝樓止煩滿 同人參麥冬棗仁地黄能益氣養血 同牛膝萆薢木瓜豨薟杜仲續斷主腰脊強

脚痺除風邪留熱　妊娠無故勿服本草經疏輯要

丹參味苦微寒主心腹邪氣赤走心故能逐心腹之邪腸鳴幽幽如走水心與脾不和則鳴寒熱積聚破癥除瘕赤走血凡血病凝結者無不治之止煩滿心氣不舒益氣益心氣「此以色爲治也赤走心心主血故丹參能走心以治血分之病又辛散而潤澤故能通利而滌邪也神農本草經百種録

山參　郗蟬草　木羊乳　逐馬　奔馬草　本草綱目丹參卽赤參一名山參一名郗蟬草一名木羊乳一名逐馬一名奔馬草蕭炳曰丹參治風軟脚可

逐奔馬故名奔馬草事物異名録

丹寒清都艱切音單赤色○丹乃石名其字從井中一點象丹在井中之形字彙

丹都干切音單赤石○說文丹巴越赤石外象丹井中象丹形篆作月青形臒等字从此精藴●象陽精外象圅蓋形象篆作丼俗作丹非同文舉要清明鑑作冃亦非正字通

丹古文冃彬同唐韻都寒切集韻韻會多寒切正韻都艱切並音單赤色丹砂也康熙字典

丹參〔原〕丹參一名赤參以色名也一名山參一名郗蟬草一名木羊乳一名逐馬一名奔馬草四聲本草云丹參治風軟脚可及奔馬故名二月生苗高一尺許莖方有稜青色一枝五葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花紅紫似蘇花成穗如蛾形中有細子根大者如指長尺餘一苗數根皮丹而肉紫味苦微寒無毒破宿血補新血安生胎落息胎破癥除瘕排膿止痛定精養神定志通利關脈婦人明理論云四物湯治婦人諸病調婦人經脈皆可通用一味丹參散與之同功廣群芳譜

丹參一名木羊乳葉似紫蘇有細毛花紫色根赤大者如指長尺餘九月十月採根含山縣志

丹參二月生苗三月開花一苗數根赤色故名蕭炳云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬又名奔馬草纖輔通志

藥屬　丹參重修鎮江府志

丹參和名　仁ニ古コ多タ久ク佐サ又按ア安ニ仁ク久サ佐增補異名　赤參別錄　山參日華　郄蟬草本經　木羊乳吳普　逐馬弘景

奔馬草參編識

丹參苦平微温酒潤微焙畏鹽水反藜蘆本草喉襟

丹參 赤參 郗蟬草 逐馬 木羊乳 山參 奔馬草 本綱丹參生山中二月生苗高一尺許莖方有稜青色一枝五葉葉如野蘇而尖青色有皺毛三月至九月開小花成穗紅紫色如蛾形中有細子根皮丹而肉紫大者如指長尺餘一苗數根此乃五參之一而五參配五臟人參入脾黄參沙參入肺白參玄參入腎黑參牡蒙入肝紫參丹參入心赤參其苦參則右腎命門之藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義爾 丹參【氣味】苦微寒 平而降陰中陽入手少陰厥陰之經心與包絡

血分藥也四物湯治婦人病不問產前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脉其功大類四物（當歸川芎地黄芍藥）故也益久服多眼赤故應性熱其云微寒恐謬也（畏鹹水反藜蘆）△按丹參往昔本朝亦有之今則無之益調血之良藥古方多用之今用之者罕

倭漢三才圖會

丹參　漢ヨリ來ル者眞ナリ但欲ニ其色之好一者赭土（アカツチ）ヲヌル能ク水ニテ洗ヒ去テ可レ用ユ　逐馬（丹參用藥須知）

丹參　和名　クハドウラン又クハガタサウ
處々深山ノ中ニ多ク有之初出ハ地ニ付テ生ス四
五月ニ至テ蘭ノ花ノ如キノ花ヲヒラク黄色ナ
リ又紫花白花ノ數色アリ其後ニ子ヲ結ブ其根
ハ赤色ニシテ少シ芍藥ニ似タリ藥ニ可入渡リ
ノ丹參ト少シク似タル事アリト雖モスコシ別
種ニ近シ本草花蒔繪

丹參　唐ヨリ來ルモノハフルシ上ニス、ヲヌ
リテ來ルユヘ藥ニ入用ルニハ上ヲヨクアライ

用ベシ脚氣ニ甚佳ナリト云リ　賀云和産相似
タルモノアリ然レ氏根白シ　會誌云方莖ニメ
アサノ葉ノゴトク春紫花アリテ香ヒ藿香ノゴ
トキモノニ條河原ニアリ此ナランカ　別本
チヤウセンキ、ヤウ　本草會誌
照任曰ク羽州矢立峠ト云フ山ヨリ丹參ヲ出ス
方言ニ　ヽ、コナカセ　ト云フ即チ獻上ス　先
生按ルニ和邦古アリケルヤ延喜式貢藥ノ内ニ
モミヘタリ中世タヘタルカ寛永年中ニ板倉ト

齋朝鮮ヨリ丹參ノ實ヲトリヨセケルヨシ羅山文集ニ見ヘタリ採藥使記

丹參ニコダグサ延喜式今新渡多シ根ニ數枝アリ枝ゴトニ長サ一寸餘或ハ二三寸徑リ一二分許兩頭細クメ連珠ノ如シ外皮赤色黄丹ヲ塗ガ如シ内ハ紫褐色ニメ白キ筋アリ苗ヲ連子タル者稀ニアリ其莖方ニメ細ク枝葉對生ス皆細毛アリ葉ハ小橢ニメ鋸齒アリ和産詳ナラズ本草綱目啓蒙

丹參　漢渡上品和産ナシ金匱要略○藥名考

奔馬草　タンジンナリ○逐馬　タンジンナリ○丹參奔馬ニコグサ○アニグサ唐藥○郄蟬草　タンジンナリ○山參　タンジンナリ○赤參　タンジンナリ○木羊乳　タンジンナリ藥品手引草

丹參　今醫家用ヒズ故ニ近來漢渡無シ和産稀ニアリ綱目附方ニ丹參酒アリ中風ニ用テ驗アリ千金方藥註

丹參　漢ヨリ來ル和産ナシ本草正譌

蔓說文藥草出上黨本草遂謂後世因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然而前漢史游急就篇遠志續斷參土瓜顔師古註參謂人參丹參紫參玄參沙參苦參也又王符潜夫論云治病當得人參反得羅服則本草之言不必也醫膹

丹參　一名鹿腹本草和名引雜要訣　和名　ツキミグサ

八月中二開ク　アキバリノ形尾州花　クワガタサウ葉ノ形

蠻名ホルミユム羅甸　シカルレイユ荷蘭　本草

和名ニ美濃國ニ殖ト云野州日光山ニ産ス又好

亭家園中ニ栽ルモアリ春宿根ヨリ生ス葉ノ形
三尖アリテ鍬形ノ如ク又牛面草(ミツバ)ニ似テ皺ニ鋸
齒アリ方莖對生シ莖地ニ搨ス高サ一二尺秋月
梢ニ穗ヲ生シ夏枯草ノ如ク節々ニ花アリ唇ノ
形ヲナシ上ハ一瓣下三瓣ニ切レテ黄色ナリ根
ノ形地楡ニ似テ紅紫色軟也一種紫花ノモノア
リ莖紫色ニシテ蔓ノ如シ地ニツク處ヨリ根ヲ
生ス根又紅紫色コノ物蘇頌ノ説トコロト符合
ス又一種紅花ニメ白班アルモノアリコノ類葉

莖皆同シタヾ紫花紅花ノモノ上品藥ニ入ルベ
シ和産ハ細ソ下品ナリ今新渡ノ内皮丹ヲ塗ル
ガ如ク肉紫色ナルモノハ卽紫花ノクワガタサ
ウナルベシ然𪜈唐ハ肥大ニメ上品也藥用ニ入
ベシ本草穿要

丹參　クワガタサウノ花紅色ノ物　葉ノ形三尖アリ
テ鍬形ノ如シ故ニ名ヅク方莖地ニ搨ス莖高サ
ニ三尺秋月穗ヲナシテ花アリ唇ノ形ノゴトク
又白桐花ノ形ニ似テ小ナリ故ニ又尾州ニテハ

アキヽリト名ヅク花紅紫色ナリ根ハ玄參ニ似テ細ク赤色ニシテ潤アリ　一種　花紅色ノ斑アルモノ　一種　野州日光山ニアリ形狀紅花ノ物ト同ジク花黄色根細ク色薄クシテ下品ナリ　本草圖譜

ニコダクサ　介古太久佐　丹參　延喜式　○ニコグサ　同上　本草藥名備考和訓鈔

丹參　登按苗高二三尺許其葉似薄荷而有微毛莖端生穗開花紅紫色似蘇花根赤色大者如指長五六寸○琉球土名血見草　琉球產物志

丹參　ツキ見草ト云ヘ𪜈シカト不的　莖方ニ
メ葉節々對メ生ス葉ルリテウ草ノ形ニ似テ本
トガリテクワ形ノカタチヲナス故ニ名ヅク秋
莖葉花穗アリ黄紫交テ更紗ノ如キ者アリ紫色
アリ黄色アリ又紅花アリト云 百花天工區別
丹參　一名赤參一名郗蟬草一名山參二月生苗
其莖方稜青色莖葉相對生形似薄荷有微毛一苗
數根其根赤大如指許長尺餘至十月採根酒洗晒
乾𥈤鹹水反藜蘆矣 人參譜

丹參　漢渡常有多故品和產未詳或云仙臺方言
赤根槃未親見其草本旗后之詳考耳本草綱目纂疏
タンジン　丹參　和產未詳物品識名
丹參　船來一品真ナリ　和產ナシ日用藥品考
丹參　山參　ニコダグサ　和產ナシ手板發蒙

本草通串卷三十一

本草通串卷三十二

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

紫參

紫參味苦寒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小

便一名牡蒙神農本經○大觀本草

本草經曰紫參一名牡蒙苦寒無毒治心腹積聚寒

熱邪氣利大便通九竅生河西及宛句治牛病生林陽 神農本經 太平御覽 ○

紫參 本經中品 【釋名】牡蒙 本經 【氣味】苦寒無毒【主治】心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便 本經 神農本經 本草綱目 ○

本草云紫參氣微寒味苦辛無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便 神農本經 湯液本草 ○

紫參味苦寒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便 牡蒙 神農本經 盧復手錄 ○

紫參味苦辛微寒無毒療腸胃大熱唾血衄血腸中

聚血癰腫諸瘡止渴益精一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及宛句山谷三月採根火炙使紫色名醫別録○大觀本草

紫參【釋名】童腸別録馬行別録衆戎別録【集解】別録曰紫參生河西及宛句山谷三月采根火炙使紫色【氣味】別録曰微寒【主治】療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精名醫別録○本草綱目

紫參　療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精名醫別録○湯液本草

〔纂〕帛青赤色从糸此聲將此切說文

陶隱居云今方家皆呼爲牡蒙用之亦少神農本草陶弘景註

○大觀本草

〔集解〕弘景曰今方家皆呼爲牡蒙用之亦少神農本草陶弘景註本草綱目

建康記曰建康縣出紫參太平御覽

范子計然曰紫參出三輔赤青色者善同上

吳氏曰牡蒙神農黃帝苦李氏小寒生河西或商山

圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大

如豆吳普本草大觀本草○

【集解】普曰紫參一名牡蒙生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月花紫赤實黑大如豆

【氣味】普曰牡蒙神農黃帝苦李當之小寒吳普本草本草綱目○臭辛夷藥對大觀本草○大根

【氣味】之才曰臭辛夷藥對本草綱目○本藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通藥性論大觀本草○

【主治】治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通甄權藥性論○

本草綱目

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渇益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及寃句山谷三月採根火炙使紫色

千金翼方

唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也

紫參京下見用者是出蒲州也唐本注大觀本草○

〔集解〕恭曰紫參葉似羊蹄紫花青穗其根皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之長安見用者出蒲州牡蒙乃王孫也葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗不相似〔主治〕牡蒙治金瘡止血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽蘇恭唐本注○本草綱目

知知乃波久差　味少苦久无香六月發花乎八月採根日爾乾用大同類聚方

臣禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦李氏小寒

生河西或商山圖聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆 蜀本草掌禹錫按○大觀本草

紫參一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行一名山羊蹄 出稽疑 和名知々乃波久佐 本草和名

(紫)帛青赤色從糸此聲將此切 說文解字通釋

紫參 本草云紫參和名知知乃波久佐 和名類聚抄

圖經曰紫參生河西及宛句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡有之苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦

有紅紫而似水莊者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草煎取半升分温三服（圖經○大觀本草）

【集解】頌曰今河中晉解齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺莖青而細其葉青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水莊者根淡紫黑色如地黄狀肉紅白色肉淺而皮深三月采根火

灸紫色又云六月采晒乾用蘇頌圖經○本草綱目

滁州紫參　濠州紫參　晉州紫參　眉州紫參三月

採根火灸使紫色備急本草圖按

壯蒙曰衆戎曰童腸曰馬行即紫參也唐明皇令方士姜撫採終南山之旱藕作湯餅賜大臣者即此草根也昆蟲草木略

【主治】主狂瘧瘟瘧衄血汁出好古王好古○本草綱目

仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩水五升煎紫參取二升却内甘草煎取半斤分溫三服湯液本草

【釋名】五鳥花綱目○時珍曰紫參王孫並有牡蒙之名古方所用牡蒙多是紫參也按錢起詩集云紫參幽芳也五葩連蕚狀如飛禽羽擧故俗名五鳥花【集解】時珍曰紫參根乾紫黑色肉帶紅白狀如小紫草范子計然云紫參出三輔有三色以青赤色爲善【發明】時珍曰紫參色紫黑氣味俱厚陰也沉也入足厥陰之經肝臟血分藥也故治諸血病及寒熱瘧痢癰腫積塊之屬厥陰者古方治婦人腸覃病烏喙丸所用牡蒙卽此物也唐蘇恭註王孫引陳延之小品方牡

蒙所主之證正是紫參若王孫則止治風濕痺證不治血病故今移附于此本草綱目

紫參味苦辛氣寒無毒氣味俱厚陰也沉也入足厥陰經肝藏血分藥也別録曰紫參生河西寃句山谷范氏曰今河中淮郡三輔商山蜀州亦有之蘇氏曰莖高一二尺葉似槐亦有似羊蹄者五月開花白色酷似葱花亦有紅紫而似水蘇者結實色黑大如豆圓聚而生其根黄赤有紋根皮紫黒肉紅白色肉淺皮深三月采根火炙紫色用李氏曰炙過色紫狀類小紫草○紫參涼血散血行血止血之藥也前古治心腹積聚寒熱邪氣通九竅利二便等證統屬血所爲患者用之無疑也故後世如金匱方別録

方甄氏方與蘇王二氏方共稱紫參治諸血病如唾血衂血便血溺血淋血腸中聚血癰腫熱血經阻瘀血金瘡留血下痢蓄血或傷寒遺熱下血如豚肝或陽明熱勝血蓄如狂狀或温瘧寒熱血結如昏迷或婦人血閉不通寒熱譫語如見鬼祟或男子血蘊腹脹身面如黃疸諸證用此苦以爆濕辛以散結寒以除熱則諸證自平矣如脾胃虛乏與肝腎不足男子陰虛失血婦人血枯經閉俱禁用之○集方治唾血嘗發用紫參四兩牡丹皮川貝母麥門冬當歸玄參

知母乾葛柿餅各二兩甘草五錢煎汁熬膏煉蜜收成每早午晚各服十茶匙燈心湯化下○治衄血便血淋血用紫參五錢水煎服本草彙言

紫參生河西及冤句山谷根長尺餘皮肉俱紫色而主療頗同人參故名紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血本草腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精原始

紫參一名牡蒙一名童腸一名馬行一名衆戎一名五鳥花苗長一二尺莖青而細葉青似槐亦有似羊蹄者五月開花絶似葱花亦有紫紅似水葒者根淡

紫黒如地黄肉紅白肉淺皮深三月採根火炙用味苦寒無毒治諸血病及寒熱瘧痢癰腫積塊之屬（群芳）

譜

〔原〕紫參一名牡蒙（與王孫同名）一名童腸一名馬行一名衆戎一名五鳥花（以形得名）苗長一二尺莖青而細葉青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色絶似葱花亦有紅紫而似水葒者根淡紫黒色如地黄狀肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙紫色用（范子計然云紫參出三輔有三色以青赤色為上）味苦寒無毒治諸血病及心腹積聚寒

熱瘡痢癰腫積塊之屬【集藻】七言古詩【增】錢起紫參歌并序　紫參幽芳也五葩連萼狀飛禽羽舉俗名之五鳥花起故山道人蘭若尤豐此藥枝書劉公詠歌之俾予繼組遠公林下滿青苔春藥偏宜間石開往往幽人尋來見時時仙蝶隔雲來陰陽彫刻花如鳥對鳳連雛一何小春風宛轉虎溪傍紫翼紅翹翻霽光貝葉經前無住色蓮花會裏暫留香蓬山才子鄰幽性白雲陽春動新詠應知仙卉老煙霞莫賞夭桃滿蹊逕　廣群芳譜

紫參　牡蒙　衆戎　馬行　童腸 事物異名

紫［賓清］祖此切音子黒赤間色 字彙

紫祖此切音子黒赤間色 正字通

紫［廣韻］將此切［集韻］蔣氏切並音呰［説文］帛青赤色

［釋名］紫疵也非正色正色之疵瑕以惑人者也 康熙字典

紫參 ［和名］知々乃波久佐［異名］童腸 別録 馬行 同 ［増補異名］牡蒙 本經 衆戎 別録 五鳥花 綱目 多識編

紫參　牡蒙　衆戎　馬行　童腸　五鳥花 ［和名］知々乃波久佐　本綱紫參苗長一二尺莖青而

細其葉青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒者其根乾時紫黒色肉帶紅白狀如小紫草【氣味】苦寒入足厥陰肝臟血分藥故治諸血病及寒熱瘧痢癰腫積塊之屬厥陰者畏辛夷

倭漢三才圖會

紫參　和名　クロ子グサ　所々山林ノ間ニ多ク有之苗ノ高サ二三寸計リ葉ハ楮ノ葉ノ如シ根ハ黒ク毛アリ其葉ノ間ニ一莖ヲ出シ白花ヲヒラク其根ハ黒ク塊ヲナス此ヲ采テ日乾スレ

バ古渡ノモノト相同シ本草花蒔繪
紫參一名童腸○紫參一名牡蒙○牡蒙同名多シ本
草左券ニ詳ニ辨ス用藥須知
紫參　赤詳　別本ニ云一種紫花紫葉ニメ葉薄
荷ニ似タリコレ・ヱイ山ニアリ　集解　水莊
ヲ丶ケタテ本草會誌
紫參　チ丶ノハグサ和名鈔　ハルトラノヲ　イロ
ハサウ尾州〔一名〕青參本草彙言　諸州深山陰處溪側
ニ多ク生ス三四月根頭ニ先穗ヲ出ス人家ニ移

シ栽ル者ハ二月ニ開ク其長サ一二寸花ハ碎小白色ニシテ粉紅ヲ帶蓼花ノ狀ニ似タリ尋テ數葉ヲ出ス形拳參葉ニ似テ短ク濶シ面ハ深綠色背ハ微白色其根地黃ノ如ク長クシテ數段アリ地上ニ延年ゴトニ一段ヲマシ段ゴトニ一寸餘細條ニテ相連リ連珠ノ如シ年久シキ者尺許ニ至ル黑褐色ニシテ外ニ褐色ノ薄皮アリテ包ム又細葉ノ者小葉ノ者アリ　舶來ハ紫參拳參混雜ス宜ク揀ビ別ツベシ 本草綱目啓蒙

紫參ノ春地上ニ花計リ咲出テ後ニ水引草ノ如キ蕊ヲ出ス大峯行者堂ノ邊ニ澤山ニコレ有リ

藥名考

紫參 ヤナギソウ イブキトラノオ 江州伊吹山中ニ多ク産ス春宿根ヨリ苗ヲ發ス數葉叢ヲ作ス猪耳(ギシ〳〵)菜葉ニ類シヤヽ小ニメ尖峭ナリ緑色面ハ深ク背ハ淡シソノ柄長クシテ紅紫色ナリ四月ニ葶ヲ抽ツ高サ一二尺ソノ葉互生ス更ニ尖細ニシテ榦ヲ包ムヿ蓼族(タデルイ)ノ如シ穗ヲ莖頂ニ生ズ長サ二三

寸碎花簇鋪ス皆ナ六出ニシテ白色形チ水蓬花（ハブテコブラ）ニ類ス黄褐萼コレヲウクソノ子花中ニ熟ス三角ナリ亦相似タリ 花彙

馬行　シジンナリ○童腸　シジンナリ○牡蒙　シジンナリ○五鳥花　紫參ナリ○紫參　牡蒙

チ、ノハグサ和藥ナリ 藥品手引草

紫參　一名山羊蹄 本草和名 引誓疑　青參 本草彙言　和名

チ、ノハクサ 本草和名　クリン雪フデ　西湖云ク

リンユキフデ葉ハ羊蹄ノ如ク莖直上シ根外紫

黒ニシテ内紅白色ナリ豆州駿州相州ノサカヒニアリ又ユキフデサウト云モノアリ花サキ後葉ヲ出スコレモ又紫參ノ類ナリ松岡元達イブキトラノオニアツ又コレ紫參ノ一種ナリ藥用ニハクリンユキフデヲ用テヨシ云云クリン雪フデハ日光足尾九藏峠ニ產スルハルトラノオナリコレハ形ハルトラノオニ似テ莖長ク七八寸葉莖ヲ抱テ生ズユキフデサウハハルトラノオナリ一名イロハサウ尾州蘭山ハコノ物ヲ充ツ諸

國深山幽谷ニ生ス宿根ヨリ先花穗ヲ生ス形蓼花ニ似タリ葉ハ拳參ニ似テ短濶又虎杖葉ニ似テ背紫色根連珠ノ如ク一年一塊ヲ生ス土上ニ顯ルゝ外皮赤褐色内淡紅色ナリコレ蘇頌ノ說ニ亦有似羊蹄者ト云コレナリ其似槐葉ト云和產不詳備急本草ノ圖ニテハハルトラノオト八見エズ 本草穿要

紫參 ハルトラノオ 諸國深山ニ生ズ二月葉ニ先ツテ花穗ヲ生シ形チ蓼花ニ似テ白色葉ハ

虎杖ニ似テ軟ク背紫色ナリ根連珠ヲナシ一年一塊ヲ生ス外皮赤褐色肉淡紅色コレ蘇頌ノ説ニ赤有似羊蹄者ト云コレナリ　一種クリンユキフデ　日光足尾九藏峠ニ産スルハハルトラノオナリ葉ハハルトラノオト同シ莖長ク葉ハ莖ヲ抱テ三四葉互生ス花ノ時遲シ根ハ連珠ヲナス花色ハハルトラノオト同シ本草圖譜

紫參 尾張 イロハサウ 本綱十二 ○ハルトラノヲ 紫參 本綱十二 和産深山陰地ニ生ス春新葉イマダ出ヌ先ニ根ヨリ花莖一寸許リ穗ヲ生ノ白花簇生ス蓼

ノ如ナリ花ノ後ニ葉生ノ莖葉又蓼ニ似タリ或ハ虎杖ニ似テ長シ紫色ニノ二三寸一根ニ葉ヲ生ス根ノ形地黄ノ如ニノアトサキ尖リ細ノ連珠ヲ作ス乾物ニノ紫色ノ皮アリ肉ハサクラ色ナリ陽地ニ栽レハ瘦テ小シ和産ノ根ハ藥舖ニナシ漢渡ハ今拳參ト交リ糸ル地黄ノ如ニノ前後尖ル者紫參ノ真物ナリ扁大ニノ芦頭曲ル物拳參ナリ藥店ニコレヲ撰ミイダシテ金線重樓トトナ名テ貨ル甚非ナリ金線重樓ハ蚤休ノ事ナリ○チヽノハヽグサ 紫參 和名 知々乃波久佐

［鈔］本草藥名備考和訓鈔

紫參 ユキフデ 葉形車前葉ニ似テ小也根フトク屈曲ノ節々薄皮アリ小草也傍ニ小莖ヲ生ス早春白花小穗ヲナス冬モ葉アリ 百花天工區別

紫參 花師言伊吹虎尾此草似羊蹄草葉而尖長其花如蓼花水紅色是卽二蘇所注草也似槐葉者斯方未知有之（本草綱目纂疏）

イロハサウ（ハルトラノヲ） 紫參（物品識名）

紫參（根） イロハサウ 舶來ノ物希ナリ 和産多シ藥舗ニ售ラズ（日用藥品考）

紫參（ハルトラノオ） 青參 唐ヨリ來ル紫參中ニ拳參ヲ雜ヘ渡ス（手板發蒙）

紫參通竅降氣利尿（ハルトラノオ）〔本經曰〕紫參味苦辛寒

主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便【案】其味苦涼降故能通竅下逆氣利尿【紫參湯】下痢肺痛【澤漆湯】脈沈者圖經云治肺欬上氣脈沈者【撰品】紫參形似地黄而紫黒色者是也○紫參生深山溪側葉似蛇莴（イヌイタドリ）草而小莖三四寸至春出穗開水紅（ウスベニ）花似蓼花而小根紫黒色横生作連珠又有圓葉及細葉者根形色皆同古方藥品考

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

王孫

王孫味苦平主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛

神農本經○大觀本草

本草經曰王孫味苦平治五藏邪氣濕痺四支疼酸

生海西 神農本經 太平御覽 ○

王孫 本經 中品 主治五臟邪氣寒濕痹四肢疼酸膝冷痛

本經 神農本經 ○ 本草綱目

王孫味苦平主五藏邪氣寒濕痹四肢疼酸膝冷痛

神農本經 ○ 盧復手録

王孫味苦平無毒療百病益氣一名黃孫一名黃昏

生海西川谷及汝南城郭垣下 名醫別録 ○ 大觀本草

王孫【釋名】黃孫 別録 黃昏 別録【集解】別録曰王孫生海西

川谷及汝南城郭垣下【主治】療百病益氣 別録 名醫別録 ○ 本

草綱目

〔古文王〕古文〔王〕天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王凡王之屬皆从王李陽氷曰中畫近上王者則天之〔孫〕子之子曰孫从子从系系續也思魂切从兩方切說文

菊一名帝女　牡蒙一名王孫駢香儷艷

黄孫吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名海孫一名蔓延吳普本草○大觀本草

吳氏本草經曰黃孫一名王孫一名蔓延一名公草一名海孫神農雷公苦無毒黃帝甘無毒生西海川谷及汝南城郭垣下蔓延赤文莖葉相當○吳普本草　太平御覽

王孫〔釋名〕普曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延〔集解〕普曰蔓延赤文整延相當〔氣味〕普曰神農雷公苦無毒黃帝甘　吳普本草○本草綱目

王孫一名黃孫一名黃昏孫思邈有黃昏散注云黃昏木或曰合歡合昏夜合花陳無已云採囊一試黃

昏湯艸部木部黃昏爲二物郭璞曰守宮槐晝日聶合而夜舒布也江東有木與此相反俗因名合昏古今注云合歡似梧桐枝葉互相結風來解使人不忿嵇康種之於舍前（續博物志）

陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者（神農本草陶弘景註○大觀本草）

【集解】弘景曰今方家皆呼爲黃昏云牡蒙市人少識者（神農本草陶弘景註○本草綱目）

唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙

無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虚益氣除脚腫發陰陽也唐本注○大觀本草

〔集解〕恭曰按陳延之小品方述本草牡蒙一名王孫徐之才藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉皆紫色唐本注○本草綱目

王孫味苦平無毒主五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣呉名白功草楚名王孫齊名長孫一名黄孫一名黄昬一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下千金翼方

【集解】【藏器】曰旱藕生太行山中狀如藕【根】【氣味】藏器曰旱藕甘平無毒【主治】旱藕主長生不飢黑毛髮藏器

本草拾遺○本草綱目

王孫　吳名白功草楚名王孫長名長孫楊貞兩反一名黃孫一名海孫一名蔓延一名黃民一名牡蒙已上二名出陶景注一名公草出釋藥性和名奴波利久佐一名乃波利本草和名

臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色蜀本草掌禹錫按○大觀本草

王 天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三為王凡王之屬皆從王臣鍇曰地以承天易曰坤乃順承天故下畫上偃下畫地也

孫 子之子也從子系續也臣鍇曰會意素昆反 説文解字通釋

王孫 本草云王孫一名黃孫 和名沼波利久佐此間云豆知波利 和名類聚鈔

王孫曰黃孫曰黃昏曰海孫曰蔓延又楚曰王孫齊曰長孫方家謂之牡蒙 昆蟲草木略

王孫生海西川谷葉似及已根長尺餘皮肉皆紫色

齊名長孫又名海孫楚名王孫味苦平無毒主五臟邪氣寒濕痺四肢酸疼膝冷痛療百病益氣本草原始

釋名時珍曰紫參一名牡蒙本部合歡一名黃昏皆與此名同物異

集解時珍曰王孫葉生顛頂似紫河車葉按神農及吳普本草紫參一名牡蒙陶弘景亦曰今方家呼紫參爲牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏于王孫下乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙爲二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及

已但古方所用牡蒙皆爲紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可不辨唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡蒙乃王孫也蓋紫參止治血證積聚癥痢而王孫主五臟邪氣痺痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下本草綱目

〔王〕往防切旺平聲君也天下歸往謂之王○古文从

一从土作王同文舉要泥从土篆作𡈼𡈼別作天與天地之天相似並非

〔孫〕蘇昆切損平聲子之子爲孫○說文从系續也徐曰遜也子道遜順當續而行之故子系爲孫篆作𢎟 正字通

王〔陽清〕于方切旺平聲君也主也天下歸往謂之王○古文王字上二畫密下一畫疎金玉字三畫皆均無點秦用隸書以其與帝王字無辨故加點爲玉以別之而以畫均者爲帝王字 字彙

王〔廣韻集韻韻會〕並雨方切音徨〔廣韻〕大也君也天

下所法也〔正韻〕主也天下歸往謂之王〔類篇〕隷始玉如點以別帝王字

〔孫〕〔廣韻〕〔集韻〕思魂切〔説文〕子之子也从子从系系續也言順續先祖之後也（康熙字典）

王孫〔增〕〔本草綱目〕王孫一名牡蒙（與紫參同名）一名黄孫一名黄昏（陶弘景曰今方家皆呼為[illegible]黄昏云牡蒙市人少識[illegible]）一名旱藕（其根如藕）呉普曰楚名王孫齊[illegible]名白功草又名蔓延赤文鼈延相當蘇恭曰葉似及已而大根長尺餘皮肉皆紫色李時珍曰葉生頂上似紫河車葉氣味苦平無毒治五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝

冷痛瘵百病益氣長生不飢黑毛髮〔彙考〕〔增〕唐書方技傳〔開元末姜撫言終南有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能銘藥石曰旱藕牡蒙也方家久不用撫易名以神之〕廣群芳譜

王孫〔和名〕土知波利〔異名〕牡蒙弘景黃孫別録黃昏同〔增〕補異名〔旱藕 長孫 海孫 白功草 蔓延 王孫〕多識編

王孫 又ハリ 又ノハリ 藻鹽草

王孫 牡蒙 黃孫 黃昏 旱藕〔和名〕沼波利

久佐　又云豆知波利　本綱王孫生山中其葉生
顛項似紫河車葉又似及已而又根長尺餘皮肉亦
紫色牡蒙與紫參同名也黃昏與合歡木同名但古方所用牡蒙皆爲紫
參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可不辨氣味
苦平療百疾補虛益氣主五臟邪氣寒濕痺四肢疼痠
膝冷痢疾金瘡破血生肌止痛△按王孫丹參紫參
皆有和名則往古本朝有之明焉今無識者惜哉特
無毒之草而療病之功最大也然亦方藥中用之者
希也倭漢三才圖會

王孫　和名カシハクサ　本草葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗不相似是乃本邦所々山林ノ中ニ多ク有ㇾ之葉ハ及已ニ似テ長サ五寸計六七葉丸ク連テ車輪ノ如シ其心ニ三四寸ノ一莖ヲ出ス一莖ノ上ニ白花ヲ付ク形チ及已ノ如シ根モ及已ニ同シテ頗ル長シ庭間ニ栽テ可ㇾ愛ス

本草花
蒔繪

王孫　未詳　別本云車葉ノ山慈姑ニ似タリト云可考　釋名ノ早藕カタコユリ江戸方言加賀ヨリ

此ヲ搗テ葛ヲ製スルヤウニメ餅子トナシ将
軍ヘ獻上スルナリカタコモチト名ク 牡棠
早休 集解ノ紫河車葉ハ金銀重樓ナリ 本草會誌
王孫 ツクバ子サウ 同名アリ 東北州深山幽谷ニ
生ズ一根一莖葉ハ百合葉ニ似テ薄ク縦文アリ
四葉莖端ニ攅生メ傘ヲ張ガ如シ又三葉五葉ヨ
リ七八葉ニ至ル者アリ其上ニ一莖ヲ出シ一花
ヲ著四出緑色内ニ金線八條長ク出別ニ蘂アリ
又一種延年サウト呼者アリ一名ヤクトウシ

ヤウラウサウ勢州　ヤウラウグサ同上　ホツポ
ウドクヱン　キドクヱン　タチアフヒ武州　ク
ルメキナ越後　ミツバアフヒ　ミツバニンジン
ヱンレイサウ　ヱレサウ花戸　ヱレグサ阿州　此
草モ深山幽谷ニ生ズ形モ相似テ大ナリ葉ハ圓
尖ニメ細長ナラズ三葉コトニ莖端ニ並ビ生メ
傘ノ狀ヲナス中心小莖ヲ出シ花ヲ開ク三瓣紫
色或ハ綠色或ハ白色或ハ粉紅色數品アリ花大
サ五六分中ニ圓實アリ六ノ紫蕋圍ム其實生ハ

緑色熟ハ黒色根ハ莪朮根ノ形ニ似テ白色味苦シ和州村民乾シ貯テ傷食ノ藥トス訛テ「エレンサウ」ト呼市中ニ或ハ僞テ莪朮ニ充或ハ唐藜蘆ニ下ジユ本草綱目啓蒙

旱藕　或問世俗呼ニ蔓搭各一者何曰旱藕是也苗高二尺許紫色葉如竹葉萊潤大而有黒斑點初春開花紫色根如芋可煮食可爲粉或切煮作麪或蒸炙爲圓子皆甘美可口其性補益五臟按唐書云姜撫宋州人自言通僊人不死術隱居不出玄宗開元末

太常卿韋縚祭名山因訪隱民還白撫已數百歲召至東都舍集賢院因言服常春藤使白髮還鬢則長生可致藤生太湖最良終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣因詔天下使自求之宰裴耀卿奉觴上于萬歲壽帝悅御花萼樓宴群臣出藤百奩徧賜之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生撫又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能識藥石曰常春藤者千歲虆也旱藕牡蒙也方家久不用撫易名以

神之此説相合（草木辨疑）

牡蒙　二種アリ古方書ニ在ハ紫參ナリ後世ノ書ニ在ハ王孫ナリ和名ツクバ子草幽谷ニ生メ葉四五葉ツクバ子ノ如シ（藥名考）

長孫　王孫ナリ○黄昏　王孫ナリ○海孫　ワウソンナリ○旱藕　ワウソンナリ○蔓延　王孫ナリ（藥品手引草）

王孫　一名黄香赤詳或人曰ヱンレイサウ一名ヤウコウサウ（伊豫）　博物志云王孫一名黄孫一名

黄昏孫思邈有黄昏散注云黄昏木或曰合歡合昏夜合花陳無已云探囊一試黄昏湯草部木部黄昏爲二物郭璞曰守宮槐晝日聶合而夜舒布也江東有木與此相反俗因名合昏千金方藥註

王孫　一名旱藕諸本草家和産アルコトヲ不レ知愚案是カタクリ一名カタコ日光山中ニアリ救ヲ掘製メ葛粉ノ如シカタクリノ粉ト云北國ニモ製之其形狀ヲ詳ニスルニ旱藕ナリ大和本草カタコヲ栽セ其旱藕ナルコトヲ不レ知缺典ナリ

王孫　ヲニノヘユハキ　處々山陰ニアリ宿根ヨリ生ス莖紫色頂ニ四葉對生ス全ク及已ニ似テ大ニ高サ一二尺花穗モ及已ニ似テ長大ナリ蘇恭ノ説ニ葉ハ似及已而大根長尺餘皮肉皆紫色トイフニ符合ス先輩ツクバネヲ充レドモ根白色ナレバ集解ノ説ニ合ガタシ　一種青莖ノ物　本草圖譜

ヌバリクサ　王孫　和名鈔　沼波利久佐　○ツチハリ　王孫　和名鈔　豆知波利　○ツクバ

子サウ
王孫【本綱十二】深山陰地ニ生ス春旧根ヨリ苗ヲ出メ一根一莖稍ニ三四葉對シ着ク或肥タルハ六七葉車輪ノ如ナリ一葉ノ形肉桂ノ如堅ニ三縦道アリ叡山貴船ニ産スレ氏苗小ナリ形ハ子ニ似タリ葉ト同色ノ花有リ根ハ連珠ナリ

○ヤウラウサウ 王孫一種【勢州】

○エレンサウ【和州】王孫一種

○エレグサ【阿州】同上

○エレサウ 同上和書ニ延齡草ト此花紫白ノ者【日光】ニアリ或全白花又淡紅有リ藥店此根ヲ採リ眞ノ莪朮ト云テ貨ハ非ナリ苦味強故鮮積ニ用ニ効有ト云

○キドクエン 王孫一種エンレイサウ

○ミツバニンジン 王孫一種エンレイサウ

○ミツアフヒ 王孫一種 本草藥名備考和訓鈔

王孫 或云立葵(タチアフヒ) 産伊豆越後下野東奥諸山此草一莖四葉葉心開五辨白花

當否未詳○旱藕[釋名]或以爲加多久利非也[按加多久利者]

[益園慈姑之屬]鄭樵草木略云終南山有旱藕狀類葛粉旱

藕者牡蒙也牡蒙則王孫[本草綱目纂疏]

王孫〔增〕釋名時珍曰合歡一名黃昏　堀北渚先生

云綱目合歡無黃昏之名則其非一名也明矣但卿

卿代醉及本經逢原有黃昏之名耳[重修本草綱目啓蒙]

ツクバ子サウ　王孫ナリ○ワウソン　王孫ナ

リ[物品識名]

本草通串卷三十四

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

紫草

紫草味苦寒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道一名紫丹一名紫芺神農本經大觀本草○

紫草 本經中品 主治心腹邪氣五疸補中益氣利九竅 本經

神農本經○本草綱目

本草云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道

治腹腫脹滿去土用茸神農本草○湯液本草

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九

竅神農本經疏○吳懐祖輯要

紫草味苦寒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通

水道神農本草經○百種録

紫草味苦寒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通

水道　紫丹　紫芙神農本經○盧復手録

紫草味苦寒無毒療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶生碭山山谷及楚地三月採根陰乾名醫別錄○大觀本草

紫草【釋名】紫丹別錄紫芙音襖【集解】別録曰紫草生碭山山谷及楚地三月采根陰乾【主治】通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶別錄名醫別錄○本草綱目

藐茈草爾雅釋草

爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白爾雅○大觀本草

爾雅曰藐茈草也郭璞曰可以染紫也一名茈莨廣雅云爾雅○太平御覽

〔釋名〕藐〔爾雅〕音邈 爾雅○本草綱目

昌容常山之道士也自稱殷王女二百餘年而顏色如少能致紫草與染家得錢以遺孤老 列仙傳

〔紫〕帛青赤色从糸此聲將此切〔艸〕百芔也从二屮凡艸之屬皆从艸 倉老切〔茈〕茈艸也从艸此聲將此切〔藐〕茈艸也从艸貌聲莫覺切 說文

說文曰茈藐紫草 說文○太平御覽

紫芝生於山而不能生於盤石之上 淮南子說山訓

淮南子曰紫草生於山不能生盤石之上 淮南子 太平御覽 ○

吳氏本草曰紫草節赤二月花　本草曰紫草一名

地血 吳普本草 太平御覽 ○

〔釋名〕地血 吳普 吳普本草 本草綱目 ○

茈䓞茈草也 廣雅

廣雅曰紫芴紫草也 廣雅 ○ 太平御覽

〔釋名〕茈䓞 廣雅紫戾 音 廣雅 ○ 本草綱目

石井山曾有行人見山上有採紫草者此人謂村人

揭鍤而往見山上人便去聞有呼昌容者曰人來取

爾草既至山頂寂寞無所見潯陽記

北五十里曰勞山多茈草一名茈莫草染紫也○又東北七十里曰咸山草多茈草○又東北三百里曰隅陽之山其草多茈山海經

山海經曰勞山多茈草一名紫英山海經○太平御覽

抱朴子曰黃金成以爲丸以紫草煮一丸咽其汁可百日不飢抱朴子

博物志曰平氏陽山紫草特好其他者色淺○博物志太平御覽

藐茈草〔註〕可以染紫一名茈萒廣雅云爾雅郭璞註

陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之卽是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於此者神農本草陶弘景註○大觀本草

〔集解〕弘景曰今出襄陽多從南陽新野來彼人種之卽是今染紫者方藥都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國者染色殊黑比年東山亦種之色小淺於北者神農本草陶弘景註○本草綱目

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用炮炙論○大觀本草

根〔修治〕斅曰凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用炮炙論○本草綱目

〔種紫草第五十四〕爾雅曰藐茈草注一名紫芺廣志曰隴西紫草紫之上者本草經曰一名紫丹博物志曰平氏山之陽紫草特好也黃白軟良之地青沙地亦善開荒黍穄下大佳性不耐水必須高田秋耕地至春又轉耕之三月種之耬耩地逐壟手下子良田一畝用子二升

薄田用子三升下訖勞之鋤如穀法唯淨唯佳其壟底草則拔之(壟底用鋤則傷紫草)九月中子熟刈之候稃(芳蒲反)燥載聚打取子(濕載子則鬱浥)即深細耕(不細不深則失草矣)尋壟以杷耬取整(收草宜併手力速竟為良遭雨則損草也)一扼隨以茅結之(擘葛彌善)四扼為一頭當日則斬齊顛倒十重許為長行置堅平之地以板石鎮之令扁(濕鎮直而長燥鎮則碎折不鎮賣難售也)兩三宿豎頭著日中曝之令浥浥然(不曝則鬱黑太燥則碎折)五十頭作一洪(洪十字大頭向外以葛纏絡)著敞屋下陰涼處棚棧上其棚下勿使驢馬糞及人溺又忌煙皆令草失色其利勝藍

若欲久停者入五月内著屋中閉戸塞向密泥勿使風入漏氣過立秋然後開草出色不異若經夏在棚棧上草便變黒不復任用齊民要術

藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡瘑癬藥性論○大觀本草

氣味 權曰甘平

主治 治惡瘡瘑癬甄權藥性論○本草綱目

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶

一名紫丹一名紫芺生碭山山谷及楚地三月採根

陰乾千金翼方

唐本注云紫草所在皆有大觀本草唐本注○

〔集解〕恭曰所在皆有人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色秋月熟唐本注○本草綱目

茈子此反〔上〕新撰字鏡久比井

〔茈〕茈草也從艸此聲臣鍇曰卽今染紫草也司馬相如上林賦書茈薑字如此津矣反〔藐〕茈草也從草貌聲亡撲反說文解字通釋

蕭史與穆公鍊飛雪丹第一轉與弄玉塗之今之女

銀朱臙粉也三代以降塗紫草爲臙脂周以紅花爲之或曰出於閼氏續博物志

藐亡角反又亡校反 茈子爾反 莨力計反經典釋文

紫草 一名紫丹一名紫芺一名藐仁諝音亡角反出蘇敬註 二名野葵一名紫給一名茈莨音戾出兼名苑一名紫莨出尒雅注 和名无良佐岐本草和名

臣禹錫等謹按廣雅云紫草一名茈莨藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡瘑癬蜀本草掌禹錫按〇大觀本草

藐茈草疏藐一名茈草根可以染紫之草廣雅一名

茈莀本草一名紫丹唐本注云苗似蘭香莖赤節青
花紫白色而實白也邢昺爾雅疏
圖經曰紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家
園圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅
謂之茈莀苗似蘭莖赤節青二月有花紫白色秋實
白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒
時疾發瘡癮疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行
方治豌豆瘡煑紫草湯飲後人相承用之其効尤速
圖經〇大觀本草

【發明】頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發痘瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速蘇頌圖經

○本草綱目

紫草　單州紫草　東京紫草 三月採根陰乾 備急本草圖技

紫草　氣寒味苦無毒【本草】云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道治腹腫脹滿去土用茸 湯液本草

【氣味】元素曰苦溫 張元素 本草綱目 ○

【紫草】制痘疹之偏【紫草】味苦寒無毒通九竅退腫通

淋藥性賦

紫草　味苦氣寒無毒人家園圃多有種栽三月採根可煎染紫凡資入藥去根取茸益氣補中通竅利水治目黃成疸療腹滿作疼合膏敷瘑癬瘡瘍單煮托豌痘瘡疹本草蒙筌

紫草味苦性寒無毒入心小腸二經主心腹邪氣脹滿作痛癰腫諸毒除五疸利九竅通水道小兒血熱痘瘡尤為要劑取嫩茸去鬚用　按紫草主血熱本入心經而小腸者受盛而與心應者也故并入之邪

氣諸症咸本于熱令清其心而自愈矣　雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩刲用每事紫草一斤用蠟二兩鎔化用　鐫補雷公炮製藥性解

紫草【釋名】鴉銜草○時珍曰此草花紫根紫可以染紫故名爾雅作茈草猺獞人呼爲鴉銜草【集解】時珍曰種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後釆根陰乾其根頭有白毛如茸未花時釆則根色鮮明花過時釆則根色黯惡釆時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并烟氣皆令草黃色【氣味】時珍曰甘鹹寒入手足厥陰經【主治】治斑疹痘毒活血涼

血利大腸時珍

【發明】時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於凉血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉澁者宜用之已出而紫黑便閉者亦可用若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤爲有益又曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一槩用之非

矣本草綱目

紫草味苦氣寒無毒入足少陰厥陰經別錄曰紫草生碭山山谷及楚地李氏曰今出襄陽多從南陽新野來二月逐壟下子苗似蘭香赤莖青節紫花白實其實秋月乃熟春社前後采根頭有白毛如茸以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并烟火氣不爾能令根色黃也如未開花時采取根色鮮明如已開花根色黯顯染色不堪用也雷氏曰修治每觔用蠟二兩溶水拌蒸待水乾去頭并兩畔鬚細剉用○紫草涼血解疹毒之藥也前古主利九竅通水道散五疸逐心腹邪氣腫脹滿痛等疾凡關濕熱血氣閉火結之證咸宜用之後人推廣此意通治斑疹痘毒欲出未出之際根暈紫黑或已出

仍紫黑乾枯口渴便閉熱極者投之即透發鬱毒色轉紅潤誠爲痘家起死回生之首劑也如脾元惡薄弱之子或痘色紅潤或根暈淡紅及白陷下塌與大便通利者切宜忌之○徐仰垣先生曰紫草涼血解毒古方稀用今時醫治傷寒熱極與痘疹熱閉不出以此發透獨行有効今人不達此理一槩用之非矣如前曾氏仁齋公有云脾實協熱者可用脾虛協寒者不可用慎之慎之二句盡之矣○集方治痘瘡深紅色或紫或黑陷乾枯便閉用紫草三錢紅花子

筧橋生地貝母牡丹皮各一錢甘草五分濃煎汁加
生犀角汁十匙至五十匙量兒大小和之在二朝及
三四五朝稍有元氣雖危可生痘疔立解如痘瘡夾
斑疹者本方加石膏麥門冬花粉竹葉如痘毒須加
黃耆金錢花鼠粘子白芷各三錢○治癃痘便閉用
紫草五錢瓜蔞實一箇打碎水煎服○治小便淋血
小水不通用紫草瞿麥滑石各三錢甘草一錢水煎
服○治吐血衂血不大凶亦不盡止起居如故飲食
如常一歲之間或發二三次或發五六次久必成勞

用紫草懷生地各四兩白果肉百個茯苓麥門冬各三兩煎膏煉蜜收每早晚各服十餘茶匙白湯下本草

彙言

紫草生碭山川谷及楚地可以染紫故名一名茈䓞字說曰綟紫也綟以䓞染故糸在左紫或染或不故糸在下綟人染也其爲此也有戾焉或不則無戾也此而已䓞可染紫謂之茈䓞則茈言本紫䓞言所染所染戾彼而此者也又一名紫丹一名紫芺味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒及面皶紫草有粗細長短不等

色蒼紫皮皺肉白者佳形光者不堪用肉不紫者偽○世多用治嬰兒痘瘡使其發出

雷公云

凡使先用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩剉用每事紫草一斤用蠟二兩鎔化用或以酒洗並宜

本草

原始

紫草 痘毒以根一錢陳皮五錢葱白三根新汲水煎服小兒白禿用根煎汁塗之

宜種鬆沙地三月採去根取茸煎汁染紫苗生時拔去根旁之草若用鋤恐傷其根耳 致富全書

紫草一名紫丹一名紫芺一名茈莀一名藐一名地血一名鴉銜草生碭山山谷南陽新野及楚地苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白結實亦白紫根色紫

可以染紫味甘鹹氣寒無毒入心包絡及肝經血分凉血和血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉澀者宜用得木香白朮佐之尤妙已出而紫黑閉者亦用若出而紅活者及白陷大便利者切忌益脾氣虚者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一槩用之則非矣一切惡瘡瘍癬腫毒亦可用〔種植〕宜黃白輭良之地青涉地亦善開荒冬撥下大佳性不堪水必須高田秋耕深細耢平至春又轉耕之三月種耬耩地逐壠手下子良田一畝用子二升半薄田三升下訖耢之或以輕碌碡過地潔淨為佳壠底草手拔之〔刈穫〕

九月中子熟刈之候燥聚打取子收草宜速竟爲良一把隨以茅束之擘蒿尤善四把爲一束當日斬齊一頭一倒十層許爲長行置堅平地上板石壓之令一編兩三宿堅頭置日中曝之令浥浥然五十頭作一洪著屋下陰凉處棚棧上棚下勿有驢馬糞及人溺又忌烟皆令草失色其利勝藍若欲久停者入五月內著屋中閉門塞向密泥勿氣風入漏氣過立秋然後開出草色不黑若經夏在棚棧上草便變黑不復任用

製用 秋深子熟傍去其土連根取就地鋪齊少乾輕振其土以茅藁束切去虛稍以之染矣

紫其色 群芳譜 殊美

紫草 爾雅 藐茈可以染紫一名茈莨丹鉛錄云苛小草也今但知爲苛刻之苛藐紫草也今但知爲藐然之藐 閩書南產志

紫草 紫丹 紫芙 異名 物

紫草者所謂紫丹紫芙 切爒老 圖經引爾雅藐 音邈 廣雅謂之茈葰苗似蘭莖赤節青二月花紫白色妄引紅花爲茹藘則誤矣智又惟本草於紫草既引爾雅之藐而紫胡又引藐茈草唐本注云茈是古紫字竟作茈胡又證以相如之茈薑且云此根亦紫色不亦誣乎 通雅

紫草 지치 性寒平一云味苦甘一云無毒主五疸通水道腹腫脹滿瘰惡瘡瘑癬面皶及小兒痘瘡〇生山

野處處有之即今染紫紫草也三月採根陰乾酒洗用（本草）○痘瘡須用茸（湯液）（東醫寶鑑）

紫草 甘鹹氣寒入厥陰血分（心包肝）涼血活血利九竅通二便（鹹寒性滑）治心腹邪氣（即熱也）水腫五疸癰癬惡瘡（血熱所致）及痘瘡血熱毒盛二便閉澁者（血熱則毒閉得紫草涼之則血行而毒出大便利者忌之活幼心書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣）瀉者忌用 去頭鬚酒洗（增訂本草備要）

紫草稟天地陰寒清和之氣古方惟用茸取其初得

陽氣以發痘瘡時珍曰其功長於涼血活血利大小腸故痘瘡欲出未出血熱毒盛大便閉濇者宜用已出而紫黑便閉者亦宜若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之入心包絡肝腎經血分為活血涼血之聖藥　同紅花生地甘草貝母丹皮濃煎加生犀角暈兒大小以四十九匙至半盞為度治痘瘡深紅色紫或黑陷乾枯便閉神效若在一二朝內稍有元氣雖危可生痘疔痘毒咸治之惟痘毒須加黃耆金銀花鼠黏子痘瘡夾斑癮者加硬石膏麥冬知母竹

葉一二劑卽去之　苦寒性滑通利九竅痘瘡家氣虛脾胃弱泄瀉不思食小便清利者俱禁用（本草經疏輯要）

紫草味苦寒主心腹邪氣（去心腹熱邪）五疸（濕熱在血中）補中益氣（營家之熱清則中焦和利）利九竅（諸竅不爲邪熱所閉）通水道（心氣通于小腸）

○紫草色紫而走心心主血又其性寒故能治血家之熱（神農本草經○百種錄）

紫祖此切音子黑赤間色又紫莀卽紫茢紫草也（正字通）

藐　茈莀　爾雅藐茈草疏藐一名茈草根可以染

紫之草廣雅一名茈䓞按茈通作紫　紫丹　紫芺

地血　鴉銜草　本草綱目紫草一名紫丹一名

紫芺一名地血猺獞人呼為鴉銜草又茁草亦名地

血事物異名録

紫［眞清］祖此切音子黑赤間色字彙

紫草一名紫丹又名茈䓞生碭山南陽新野及楚地

其苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實亦白

惟根色紫可以染紫三月內種宜軟沙高地性不喜

水耡種悉如治稻法其利倍於藍收時忌人溺及驢

馬糞并烟氣能令色黯秘傳花鏡

紫〔廣韻〕將此切〔集韻〕蔣氏切並音呰〔說文〕帛青赤色〔釋名〕紫疵也非正色也正色之疵瑕以惑人者也康熙字典

紫草〔原〕一名紫丹一名紫芙一名茈莀廣雅云茈莀紫草也一名藐爾雅云藐茈草一名地血一名鴉銜草本草云猺獞呼之云爾生碭山南陽新野及楚地苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實亦白色秋月熟根色紫可以染紫味甘鹹氣寒無毒補中益氣利九竅入心包絡及汗經血分涼血和血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒

盛大便閉澀者宜用得木香白朮佐之尤妙已出而紫黒閉者亦可用若出而紅活者及白陥大便利者切忌益脾氣實者可用脾氣虚反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一概用之則非矣一切悪瘡瘍癬腫毒亦可用

〔彙考〕〔増〕〔山海經〕勞山多茈草

茈草　隅陽之山其草多茈　〔博物志〕平氏山之陽紫草特好

〔廣志〕隴西紫草紫之上者〔集藻〕〔樂曲〕〔増〕宋無名氏讀曲歌紫草生湖邊誤落芙蓉裏色分都

未獲空中滌蓮子

〔別錄〕原

〔種植〕宜黄白輭良之地青沙地亦善開荒黍穄下大佳性不耐水必須高田秋耕深細耩平不深不細易生草穢至春又轉耕之三月種之耬耩地逐隴手下子良田一畝用子二升半薄田三升下訖耮之或以輕砒碾過地潔淨爲佳隴底草手拔之用鋤恐傷根不茂此草嬌嫩也

〔刈獲〕九月中子熟刈之候爆聚打取子收草宜速竟爲良濕打則子浥鬱不速恐遇雨損草一把隨以茅束之擘蔫尤善四把爲一束當日斬齊一顚一倒十層許

爲長行置堅平地上板石壓之令編兩三宿豎頭置日中曝之令浥浥然不壓難售太乾則碎帶濕爲良不曬鬱黑太燥碎折五十頭作一洪著屋下陰涼處棚棧上洪十字大頭向外以葛纏縛之棚下勿有驢馬糞及人溺又忌煙皆令草失色其利勝藍若欲久停者入五月内著窖中閉門塞向密泥勿使風入漏氣過立秋然後開出草色不黑若經夏在棚棧上草便變黑不復任用矣

〔製用〕秋深子熟傍去其土連根取就地鋪齊少乾輕振其土以茅策束切去虛梢

以之染紫其色殊美

〔増〕〔炮炙論〕凡使每一斤用蠟二兩鎔水拌蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用

〔廣群芳譜〕

藥之屬　紫草〔蕪湖縣志〕

草屬　紫草〔爾雅一名藐根可以染布〕〔織輔通志〕

草之屬　紫草〔可以泉州益燭〕〔府志〕

紫草　爾雅曰藐茈郭景純註曰可以染紫一名茈

莀茈之與紫古字通尔楊用脩丹鉛録曰茈小草也

今但知爲茈刻之茈藐草也今但知爲藐然之藐〔漳州〕

府志

紫草　出單縣味苦寒無毒圖經云苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實三月採根陰乾 山東通志

紫草 韶州府志

紫草 〔和名〕年羅左幾（ムラサキ）〔異名〕紫丹 別録 紫芙 音襖 藐 爾雅 音邈

〔増補異名〕茈莀 廣雅 紫莀 音 地血 呉普 鴉銜草 多識編

茈草　藐茈草 爾雅 ○藐亾角切 茈子爾切 ○可以染紫一名茈

莀 廣雅云 晉郭璞尔雅註 ○藐一名茈草根可以染紫之草

廣雅一名茈莀本草一名紫丹唐本註云苗似蘭香

藍赤節青花紫白色而實白也宋邢昺尔雅疏○今染紫之草也茈音紫宋鄭夾漈尔雅注○釋草云藐茈草郭氏曰可以染紫一名茈䔇說文亦曰茈藐紫草蓋茈即紫也以其可染紫故名茈上林賦有茈薑司馬彪亦云紫色之薑則茈之與紫古字通尔列仙之傳商容能致紫草賣與染家本草說云其利勝藍按種藍一畝已敵穀田一頃矣而如復勝焉有以見後世末作之盛夫紫間色奪朱者也韓子曰齊威公好服一國盡服紫五素不得一紫公患之用管仲言謂左右曰吾惡

紫臭三日境内莫有衣紫蘇代遺燕王書曰齊紫敗素也而賈十倍然則由春秋戰國以來重之矣漢相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國緑綬徐廣注曰金印綟綬綟草名也以染似緑又云似紫紫綬名緺綬音戾其色紫緺與盭同公加殊禮特服之何承天云緺音媧青紫色綬綟紫色也字說曰綟紫也綟以莀染故糸在左紫或染或不故系在下綟人染也其爲此也有戾焉或不則無戾也此而已莀可染紫謂之茈戾則茈言本紫莀言所染戾彼而此者也宋羅

爾雅翼(〇)紫草陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於北者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白臣禹錫等謹按廣雅云紫草一名茈莀

嘉祐補注本草(〇)紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈莀苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採

根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發痞瘮不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速（本草圖經）○紫草此草花紫根紫可以染紫故名爾雅作茈草猺獞人呼為鵶銜草（明李東壁本草綱目）○種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如茸未花時采則根色鮮明花過時采則根色黯惡采時以石壓扁暴乾收則忌人溺及驢馬糞并煙氣皆令草黃色（同上）○別録曰紫草生碭山山谷及楚

地李氏曰今出襄陽多從南陽新野來二月逐壟下子苗似蘭香赤莖青節紫花白實其實秋月乃熟春社前後采根頭有白毛如茸以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并煙火氣不爾能令根色黃也如未開花時采取根色鮮明如已開花根色黯黝染色不堪用也明倪朱謨本草彙言○紫草爾雅曰藐茈草郭璞註曰一名紫莨○廣志曰隴西紫草紫之上者本草經曰一名紫丹○博物志曰平氏山之陽紫草特好也○明徐光啓農政全書○齊民要術曰黃白軟良之地青沙地亦善開荒黍穄下大佳性不耐水必須高田秋耕地至春又

轉耕之三月種之耬耩地逐壟手下子（良田一畝用子二升薄田用子三升）下訖勞之鋤如穀法唯淨爲佳其壟底草則拔之（壟底用鋤則傷紫草）九月中子熟刈之候稃（芳蒲反）燥載聚打取子（溼載則子鬱浥）卽深細耕（不細不深則失草矣）尋壟以耙耬取整理（收草宜併手力速竟爲良遭雨則損草也）一把隨以茅結之（擘葛彌善）四把爲一頭當日則斬齊顛倒十重許爲長行置堅平之地以版石鎭之令扁（溼鎭直而長燥鎭則碎折不鎭賣難售也）兩三宿豎頭着日中曝之令浥浥然（不曝則鬱黑太燥則碎折）五十頭作一洪（洪十字大頭向外以葛纏絡）著敞屋下陰涼處棚棧上其棚下

勿使驢馬糞及人溺又忌煙皆令草失色其利勝藍若欲久停者入五月内着屋中閉戸塞向容泥勿使風入漏氣過立秋然後開草出色不異若經夏在棚棧上草便變黑不復任用同上○務本新書曰種訖掩瓶擺之或以輕鈍碾過秋深子熟旁去其土連根取出就地鋪穡頗乾輕振其土以茅策束切去虚梢以之染紫其色殊美同上○孔子曰悪紫之奪朱也蓋朱與紫相亂久矣仁宗晩年京師染紫變其色而加重先染作青徐以紫草加染謂之油後人指爲英宗紹

統之識已見王氏書自後只以重色爲紫色愈重人愈珍之與朱大不相類淳熙中北方染紫極鮮明中國亦效之目爲北紫葢不先染青而改緋爲脚用紫草極少其實復古之紫色而誠可奪朱按周禮義疏以朱湛丹秫三月朱乃熾之卽以炊下湯淋所炊丹秫取其汁又爾雅云一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁士冠有朱紘之文鄭云朱則四入是更以纁入赤汁則爲朱論語君子不以紺緅飾纁入赤汁則爲朱不入赤而入黑汁則爲紺更以此紺入黑則爲

緅是五入爲緅也若更以此緅入黑汁則爲玄是六入爲玄也更以此玄入黑汁則七入爲緇矣則知古之朱赤汁染之紫與朱實相去不多今之淺紫其近之矣 宋趙彥衛雲麓漫鈔 ○高麗善染糸紅紫尤妙紫草大梗如牡丹擣汁染帛甚鮮 雞林志 ○紫草爾雅藐茈注云可以染紫一名茈莀八月末種二月採根用密籠藏之見海風則爛黑 八閩通志 ○紫草爾雅藐茈可以染紫一名茈莀丹鉛録云茍小草也今但知爲茍剝之茍藐紫草也今但知爲藐藐然之藐 閩書 ○紫者所謂紫丹

紫芺哀老切圖經引爾雅藐音莫廣雅謂之茈莀苗似蘭莖赤節青二月花紫白色妛引紅花為茹藘則誤矣智又怪本草於紫草旣引爾雅之藐而紫胡又引藐茈草唐本注云茈是古柴字竟作茈胡又證以相如之茈薑且云此根亦紫色不亦誣乎又有茈籬晉傳咸劾今史新立茈籬此當讀為柴籬此茈柴通借證也明方以智通雅○紫草宜種鬆沙地三月採去根取茸煎汁染紫苗生時拔去根旁之草若用鋤恐傷其根耳清石巖逸叟增定致富奇書○紫草一名紫丹又名茈莀生碭山

南陽新野及楚地其苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實亦白惟根色紫可以染紫三月內種宜軟沙高地性不喜水鋤種悉如治稻法其利倍於藍収時忌人溺及驢馬糞并煙氣能令色黯清陳淏子秘傳花鏡

○紫草鎮按紫草茸治痘瘡一則取其陽氣初生性雖生旺其氣不甚寒茸者草之初生蒙茸柔軟之義今人不識此物予每見人重價購來形如鳥疊泥者云是紫草茸病家信以為真而又苦醫家不識率意與服見其不效只合一歸之命而已所可恨者市人

欺世媒利誤人性命深可痛也又苦醫家不識茸字之義須自種蒔取嫩茸方為的真況蒙筌云去根取茸之句可鑒也清何鎮本草綱目類纂必讀 庶物類纂

紫草甘苦鹹寒嫩而紫色染手者佳去根取茸用本草

喉襟

紫草（ムラサキ）紫丹紫芙茈莀並同爾雅謂之藐和爾雅

紫草 紫丹 紫芙 茈莀 地血 藐音邈 鴉銜

草 和名 無良佐木 本綱紫草生山谷人家亦種之根紫色而可以染紫其苗似蘭香莖赤節青二

月開花紫白色結實白色秋月熟種之法三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如茸未花時采則根色鮮明花過時采則根色黯惡采時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞並烟氣皆令草黄色

根氣味 甘鹹寒 古方稀用今醫家多用入心包絡及肝經血分其功長於凉血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉濇者宜用之已出而紫黑便者亦可用得木香白朮佐之尤爲有益若已出而紅活及白陷大便利者切可忌之 ○ 按紫草出

於薩州者最佳奥州南部津輕羽州秋田遠州中泉豫州大洲河州山田皆良但家種者不入藥用益醫方雖曰紫草可用根若謂紫草茸則可用嫩苗葉

〔染絹帛〕用紫根煎汁染之浸柃木灰汁　一方用蘇方木煎汁入緑礬少許染之浸柃木灰汁成名之贋紫經年色變

和漢三才圖會

紫草　宿根ヨリ春生シ葉ホソ長ク柳ノゴトク葉ノ表ニ小筋ナル紋ミヘテシホラシク花白ク六出ニテ小リン五月ニサク鉢ニウヘ庭ニ植テ

ナガメアリ根ハ紫草ナリ俗ニムラサキト云此根ハ衣ノ染物ニ色ヨキ紫染トナルトゾ廣益地錦抄

紫草【釋名】時珍曰此草花紫根紫可以染紫故名【修治】二三月采根陰乾去蘆頭剉用或酒洗忌火【氣味】苦寒無毒【能】入心包絡肝二經利九竅通水道傷寒時疾多用之善發小兒痘疹不出又豌痘瘡面皻𤺋瘡瘍癬活血凉血【毒】痘瘡若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之【修治】本書ノ如シ此ハ紫染屋ニテ調タルヨシ藥肆ノハ古クテアシヽ【能】本書ノ

如シ此藥外ノヿニ用ルヿハナイ血熱ノ痘瘡ニ用ルナリ〔毒〕本書ノ如シ虚寒ノ痘瘡ニハ禁用之

片玉六八本草

紫草　和名ムラサキ多クハ染家所用ノアマリヲ賣ルアリ紫草茸ト云時ハ苗出テヽ四五寸ノ時ヲ可用河内國府邊多種之家園ニウヘテ從時自カラ採修ムベシ　用藥須知

紫草　赤長ウチハ葉ニモ毛アリ長メ後ニ毛脱ス家苑ニウヘ用ユベシ　賀云ムラサキ　本草會誌

紫草 ムラサキ ムラサキ子 子ムラサキ 江戸

一名 紫果 増訂致富奇書 璚茅 事物紺珠 紫荊 正字通 芝草 郷藥本草

諸州ニ多ク栽春分後種ヲ下ス長〆苗高サ二尺許葉ハ細長ニ〆旱蓮草(タカサブラウ)葉ノ形ノ如ク互生ス夏月枝梢葉間ゴトニ白花ヲ開ク五出形梅花ニ似テ大サ三分許内ニ蕋ナシ外ニ蕚アリ亦五出ニ〆細長シ花謝〆實ヲ結ブ蕚ゴトニ一二實形圓尖ニ〆紅藍(ベニ)花實ニ似テ小シ熟〆白色或ハ淡褐ヲ帯テ光アリ京師ノ山ニ自生ナシ奥州

羽州豫州播州江州甲州總州ニハアリ其根直ニシテ皮深紫色皮汁ヲ採テ布帛ヲ染藥舖ニハ薩州奥州南部羽州最上ヨリ出ルヲ上トシ讃州豫州ヨリ出ルヲ次トシ和州江州河州ヲ其次トス上品ノ者ハ染家ニ送リ下品ノ者ヲ紫根ト名ヅケテ醫家ニ賣用ユル者宜ク揀ブベシ 本草綱目啓蒙

紫草 ムラサキ コムラサキ 秘傳花鏡譯説

紫草 紫美 ムラサキ 和藥 ○紫芙 シサウナリ

○紫丹 シサウナリ ○紫根 ムラサキノ

根　和藥品手藥引草

紫草　和名　ムラサキ　江戶方言子ムラサキ

根ヲ取テ紫ヲ染ム○南部產上品○讃岐大川山

產上品ナリ　物類品隲

紫果　ムラサキ　増訂富奇書致　大和地方多ク藝ウフ春

種ヲ下ス長ジテ苗高サ一尺以來葉ハ謝落ヲカルル金葉

ニ類シテ小ナリ又俗呼ノ琉璃草ニ似リ差互シ

テ生ス三月花ヲ開ク梢葉ノ間ニアリソノ形狀

圓瓣五出ニシテ內ニ蘂鬚ナシ又琉璃草花ニ異

ナルヿナシタヾ其色白シ又粉紅及ビ黄色ノモ
ノアリ下ニ長蕚アリテコレヲ承ク實ヲ結フソ
ノ形チ圓尖ナリ䅥子ニ類シテ大ナリ秋ニ至テ
熟ス黄白色ナリ花彙

紫草 和名 子ムラサキ 江戸 薩摩武藏上品河内國分次之又陸奥出羽遠江伊豫多ク出ス紫草汁ム
ラサキノシル紫草骨紫草心同ジ即チ紫草茸ナ
リ千金方 藥註
紫草 ムラサキ 南部ヨリ多ク出ヅ三四月實

ヲ種テ生ス又宿根ヨリモ生ズ花五瓣白色實ハ
大麻ノ如クニテ白ク根深紫色ナリ本草圖譜
紫草本草 陸奥南部ヨリ出ルモノ上品ナリ根ヲ
染モノ、用トス四月上旬ニ山畑ヘ種ヲ蒔ベシ
灰汁(アク)干(ホ)鰯(シカ)等ヲ用テヨシ花鏡曰忌人溺及驢馬糞
並烟氣能令色黯草木育種
紫草 濵紫ノハニ似テ少シ小ニ莖細ク硬ク高
八九寸莖上葉間小白花下ヨリ次第ニ開テ實ヲ
結麻實ノ形ニ似テ小也根深紫色染家紫ヲ染ム

百花天工區別

紫草　萬葉集云秋芽ハギ又云武良左伎葉類胡麻葉狹小春月開花有黄白二種紫色者赤間有之以陸奥田邉郡鹿角産者為上雖它處亦出之皆劣本草綱目

纂疏

子ムラサキ　紫草［本綱十二］○ムラサキ　紫草［無良散岐和名鈔］○ムラサキ子　紫草［本綱十二］○ルリサウ　紫草之類［本草蘇名備考和訓鈔］

ムラサキ　紫草　紫葯［物品識名］

紫草茸及根　ムラサキ　［時珍曰］古方惟用茸取其初得陽　船來ナシ　和

産多シ藥鋪ニ紫草ジヤウト云モノハ嫩苗ニメ即茸ナリ紫根ト云モノハ即全根ナリ野紫根ト云モノハ肉多シ上トス山紫根ト云モノハ肉少シ次トス紫草或ハ茶ガラデト云トキハ多ハ莖葉ナリ日用藥品考

紫根ムラサキ　芝草　紫丹山根ト里根ト二品アリ〔紫草苗〕ムラサキノナヘナリ今紫草丈ト云ハ誤ナリ山根ト云ハ奥州南部羽州最上ヨリ出ツ又薩州ヨリ出ルモ上品ナリ里根ト云ハ諸州ニテ栽ルヲ云手板發蒙

本草通串巻三十四

日本古典全集之内

本草通串

編纂者　正宗敦夫

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一

發行者　合資會社　日本古典全集刊行會

代表社員　長嶋東一

東京市豐島區長崎東町三丁目一五八

印刷者　不二印刷所　高瀬清吉

發行所　東京市豐島區長崎東町三丁目一六一

合資會社　日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十三年十一月十七日印刷

昭和十三年十一月廿三日發行

【非賣品】